

Colposcopy

A colposcopy is a test done to check your vagina and cervix for abnormal cells. You may have a colposcopy if a pap smear shows cells that look abnormal. The doctor uses a magnifying scope to check for abnormal tissue of the vagina and cervix. A small tissue sample, called a biopsy, may be removed to be checked in the lab.

Arrive on time for your test. The test takes about 15-20 minutes. Plan to be here about 2 hours.

During the Test

- You may wear a hospital gown.
- You are helped onto the exam table. Lie down on your back and put your feet in the stirrups.
- The cervix is covered with a weak vinegar solution. This makes the abnormal cells show up.
- The doctor checks your vagina and cervix for abnormal cells.
- If your doctor wants to take tissue samples from the vagina, you will feel some pain or strong cramps. This will go away in about 1 minute.
- Any bleeding is stopped with pressure and a chemical solution.

Your doctor or nurse will contact you in about 2 weeks with your test results and to discuss treatment if needed.

Soi Âm Đạo

Soi âm đạo là một thử nghiệm để kiểm tra tìm tế bào bất thường trong âm đạo và cổ tử cung. Quý vị có thể cần được soi âm đạo nếu khám chất nhầy ở âm đạo cho thấy có tế bào bất thường. Bác sĩ dùng kính phóng đại để tìm tế bào bất thường của âm đạo và cổ tử cung. Một mẫu tế bào nhỏ, gọi là sinh thiết, có thể được lấy ra để kiểm tra trong phòng thí nghiệm.

Đến đúng giờ cho thử nghiệm. Thử nghiệm cần khoảng 15-20 phút. Dự tính ở đó khoảng 2 tiếng.

Trong khi thử nghiệm

- Quý vị có thể mặc áo choàng bệnh nhân.
- Quý vị được đỡ lên nằm bàn khám. Nằm ngửa và để chân lên đồ đỡ chân.
- Cổ tử cung được bôi dung dịch dấm nhẹ. Tế bào bất thường sẽ hiện ra.
- Bác sĩ khám âm đạo và cổ tử cung của quý vị để tìm tế bào bất thường.
- Nếu bác sĩ muốn lấy mẫu tế bào từ âm đạo, quý vị sẽ cảm thấy hơi đau và bị chuột rút thật đau. Sẽ hết trong khoảng 1 phút.
- Áp lực và một dung dịch hóa học sẽ làm ngưng chảy máu.

Bác sĩ và y tá sẽ liên lạc quý vị trong vòng khoảng 2 tuần để cho biết kết quả thử nghiệm và bàn về cách chữa trị, nếu cần.

Your Care at Home

- Do not have sexual intercourse, use tampons or douche for 24 hours.
- If you had a biopsy, you may have a small amount of bloody vaginal discharge for a day. You may wear a pad.
- You may take a shower. Do not take a tub bath for 3 days. This increases your chance for infection.

Call your doctor **right away** if you have:

- A large amount of bleeding where you soak a pad in an hour
- Severe abdominal cramps or pain
- Chills or fever of 101 degrees F or 38 degrees C
- Vaginal discharge that has an strange odor

Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.

Chăm sóc ở nhà

- Đừng làm tình, dùng băng vệ sinh hoặc thụt rửa trong 24 tiếng.
- Nếu làm sinh thiết, quý vị có thể bị chảy một chút ít chất lỏng có máu khoảng một ngày. Quý vị cần mang băng.
- Quý vị có thể tắm vòi sen. Đừng tắm bồn trong 3 ngày do sẽ gia tăng nguy cơ bị nhiễm độc.

Gọi bác sĩ **ngay** nếu quý vị bị:

- Chảy máu nhiều, thấm ướt miếng băng trong một tiếng
- Chuột rút nơi bụng hoặc đau nặng
- Rét run hoặc sốt 101 độ F hoặc 38 độ C
- Chất chảy từ âm đạo có mùi lạ

Bàn với bác sĩ hoặc y tá nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào.

1/2007. Developed through a partnership of Ohio State University Medical Center, Mount Carmel Health and OhioHealth, Columbus, Ohio. Available for use as a public service without copyright restrictions at www.healthinfotranslations.com.