


# LEEP

## (Loop Electrosurgical Excision Procedure)

If your pap test was abnormal, you may need LEEP as a treatment. LEEP is done to remove tissue from the cervix.

**Arrive on time for your treatment.** It takes about 15-20 minutes. Plan on being here at least 1 hour.



### Your Treatment

- Your feet will be placed in stirrups. The doctor will use an instrument called a speculum that will be put into your vagina to keep it open. You may feel some pressure.
- Medicine is used to numb your cervix.


# LEEP

## (Loop Electrosurgical Excision Procedure)

### (الاستئصال العروي بالجراحة الكهربائية)

إذا كانت نتيجة فحص عنق الرحم غير عادية، فقد تحتاجين إلى إجراء استئصال عروي بالجراحة الكهربائية (LEEP) كنوع من العلاج. يتم إجراء الاستئصال العروي بالجراحة الكهربائية لإزالة الأنسجة المصابة من عنق الرحم.

أحرصى على الوصول في التوقيت المحدد لإجراء العملية. تستغرق هذه العملية من 15-20 دقيقة تقريباً. رتبي جدول مواعيدك مع العلم أنك ستظلين هنا لمدة ساعة على الأقل.



### العلاج

- سوف يتم وضع قدميك في الركاب. وسوف يستخدم الطبيب جهازاً يسمى بمنظار الفحص، يتم وضعه في المهبل لبقائه مفتوحاً. قد تشعرين ببعض الضغط.
- يتم استخدام مخدر لعنق الرحم.

A solution is put on your cervix to show abnormal cells.

- A magnifying instrument is used to get a close up view of your cervix.
- A fine wire loop is used to remove the abnormal tissue.
- The tissue will be sent to a lab for testing.

### **Your Care After Treatment**

Your cervix should heal completely in a few weeks.

- Rest for the next 2 days.
- You may have some mild cramping.
- You may have some vaginal discharge for about 2 weeks. This is like having a period.
- Do not use tampons, have sexual intercourse or douche for 4 weeks. This reduces your risk of bleeding and allows healing to occur.

You should have a pap test more often to check for more abnormal cells.

Call your doctor **right away** if you have:

- Bleeding that soaks a pad in 1 hour
- Severe abdominal cramps or pain
- Chills or fever of 100.5 degrees F or 38 degrees C
- Vaginal discharge that has a foul odor
- Pain not controlled by over the counter pain medicine. Do not take aspirin.

**Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.**

- يتم وضع محلول في المهبل لكشف الخلايا المصابة.
- يتم استخدام جهاز تكبير لالتقاط صورة واضحة لعنق الرحم.
  - يتم استخدام حلقة سلكية رقيقة لإزالة النسيج المصاب.
  - يتم إرسال النسيج إلى المختبر للتحليل.

### الرعاية التالية للعلاج

- يلتئم عنق الرحم تماماً في غضون أسابيع قليلة.
- استريحي لمدة يومين.
  - قد تعانيين من بعض التقلصات غير الحادة.
  - قد يخرج من المهبل بعض الإفرازات المهبلية لمدة أسبوعين تقريباً. ويشبه ذلك الدورة الشهرية.
  - لا تستخدم الفوط المهبلية أو تمارسي الاتصال الجنسي أو الدوش المهبلي لمدة أربعة أسابيع. يقلل ذلك من خطورة النزيف ويزيد من سرعة الالتئام.
- ينبغي إجراء فحوصات عنق الرحم لمعرفة إذا كان هناك المزيد من الخلايا المصابة.

### اتصلي بالطبيب على الفور في حالة:

- النزيف الذي يملئ الفوط الصحية خلال ساعة واحدة.
- الشعور بتقلصات حادة أو ألم حاد في البطن
- القشعريرة أو ارتفاع درجة الحرارة إلى 100.5 درجة فهرنهايت أو 38 درجة مئوية
- إفرازات المهبل ذات الرائحة الكريهة
- الألم الذي لا يمكن تهدئته عن طريق تناول الأدوية التي يتم صرفها دون وصفة من الطبيب. لا تتناولي الأسبرين.

تحدثي إلى الطبيب أو الممرضة إذا ساورتك أية مخاوف أو كانت لديك أية أسئلة.