

Male Circumcision

Male circumcision is the removal of the foreskin around the end of the penis. If you decide on circumcision, your baby's doctor will do it in the nursery. If your baby is small or has any medical problems, the circumcision may need to be done later. The doctor will have you sign a consent form before the circumcision is done.

During the Procedure

- The doctor will put a numbing medicine gel on the penis.
- Your baby may be offered a pacifier dipped in sugar water to ease pain.
- Your baby's legs will be held still while the foreskin is removed.
- Vaseline gauze may be placed around the end of the penis for the first 24 hours. This is to prevent the penis from sticking to the diaper.
- The procedure will last 5 to 10 minutes.

Your Baby

- Your baby may be fussy, not eat well or sleep more for the first 24 hours.
- Hold and comfort your baby.
- Redness, swelling and a small amount of bleeding may occur for the first 48 hours.
- As it heals, yellowish-white patches may appear. Do not try to wipe these off. The patches will go away as the circumcision heals.

Care After Circumcision

- Clean the penis gently with warm water each day. Pat dry.
- Watch for signs of infection such as redness, swelling or a foul odor.
- Put a small amount of petroleum jelly such as Vaseline at the end of the penis. Do this for 5-7 days each time you change the diaper.
- Your baby can take a tub bath after the circumcision is healed and the umbilical cord has fallen off.

पुरुषों का खतना

पुरुषों का खतना शिश्न के सिरे के पास की चमड़ी को हटाने को कहते हैं। यदि आप खतना कराने का निर्णय करते हैं, तो आपके बच्चे का डॉक्टर नर्सरी में ऐसा कर देगा। अगर आपका बच्चा छोटा है या उसे कोई अन्य चिकित्सकीय समस्या है, तो खतना बाद में करना पड़ सकता है। खतना करने से पहले डॉक्टर आपसे सहमति पत्र पर दस्तखत कराएगा।

प्रक्रिया के दौरान

- डॉक्टर शिश्न पर सुन्न करने वाली दवा का जेल लगाएगा।
- आपके बच्चे को दर्द कम करने के लिए मीठे पानी में भिगोया हुआ पेसीफायर दिया जा सकता है।
- चमड़ी हटाते समय आपके बच्चे के पैरों को पकड़कर स्थिर रखा जाएगा।
- पहले 24 घंटों तक शिश्न के सिरे पर वैसलीन गॉज लपेटी जा सकती है। इससे शिश्न डायपर से चिपकेगा नहीं।
- इस प्रक्रिया में 5 से 10 मिनट लगेंगे।

आपका बच्चा

- आपका बच्चा पहले 24 घंटे तक चिड़चिड़ा रहे, ठीक से नहीं खाए या ज्यादा सोए ऐसा हो सकता है।
- अपने बच्चे को थामकर उसे दिलासा दें।
- पहले 48 घंटों तक लाली, सूजन और हल्का-सा खून बहना हो सकता है।
- घाव भरते हुए, पीले-सफेद धब्बे दिख सकते हैं। इन्हें पोंछने की कोशिश न करें। खतने का घाव भरते ही धब्बे खत्म हो जाएंगे।

खतने के बाद देखभाल

- रोज गुनगुने पानी से शिश्न को धीरे से साफ करें। थपकी देकर सुखाएं।
- लाली, सूजन या बदबू जैसी संक्रमण की निशानियों का ध्यान रखें।
- शिश्न के सिरे पर थोड़ी-सी पेट्रोलियम जेली लगाएं। 5-7 दिनों तक रोज हर बार डायपर बदलते समय ऐसा करें।
- खतने का घाव भर जाने और नाल गिर जाने के बाद आपका बच्चा टब में नहा सकता है।

Call Your Baby's Doctor if there is:

- A lot of bleeding or large areas of blood on the diaper
- Increased redness or swelling
- A foul odor
- No urine output within 12 hours of the circumcision

Talk to your baby's doctor if you have any questions or concerns.

2/2007. Developed through a partnership of Mount Carmel Health, Ohio State University Medical Center, and OhioHealth, Columbus, Ohio. Available for use as a public service without copyright restrictions at www.healthinfotranslations.com.

अपने बच्चे के डॉक्टर को फोन करें अगर:

- काफी खून बहे या डायपर पर खून के बड़े धब्बे हों
- लाली या सूजन बढ़ जाए
- बदबू आए
- खतने के 12 घंटे तक पेशाब न हो

अगर आपके कोई सवाल या चिंताएं हो तो अपने बच्चे के डॉक्टर से बात करें।

2/2007. Developed through a partnership of Mount Carmel Health, Ohio State University Medical Center, and OhioHealth, Columbus, Ohio. Available for use as a public service without copyright restrictions at www.healthinfotranslations.com.

Male Circumcision. Hindi.