

Biopsy

A biopsy is the removal of pieces of tissue, which are then sent to a lab for testing. A biopsy is most often used to find cancer. Any part of the body, such as the skin, an organ or a lump can be tested. An x-ray, CT scan or ultrasound may be done to locate the biopsy site. A biopsy may be done during surgery. Your doctor will review the results of your biopsy with you at your next visit and talk to you about treatment if needed.

If you have any allergies to medicines, foods or other things, tell the staff before the test.

If you are pregnant or think you might be, tell the staff before the test.

Arrive on time for your test. You may be told to arrive 30 minutes before your appointment time. A simple biopsy takes about 15 minutes. It may take longer if several biopsies or x-rays are needed.

To Prepare

- Do not take aspirin or ibuprofen for one week before the biopsy.
- Check with your doctor about taking your prescription medicines.

During the Test

- You will lie on a table and may wear a hospital gown.
- An x-ray, CT scan or ultrasound may be done to locate the biopsy site.
- The site is cleaned.
- Numbing medicine is put into the skin. This may sting.
- When the site is numb, a small needle is put into the area to be tested. Tissues and cells are removed. In some cases a small incision is made so that tissue or a lump can be removed and tested.

생체검사

생체검사란 조직의 일부분을 떼어 낸 다음 병리 실험실에 보내 검사를 하는 것입니다. 암이 있는가 알아볼 때 생체검사를 흔히 합니다. 피부는 물론, 장기 또는 혹을 포함하여 신체 어떤 부분이라도 검사 대상이 될 수 있습니다. 조직을 떼어낼 위치를 찾아내기 위해 엑스레이, CT 스캔, 또는 초음파를 사용할 수 있습니다. 생체검사는 수술 중에 할 수도 있습니다. 생체검사 결과를 의사가 검토한 다음 환자에게 설명하고, 치료가 필요하면 그 방법을 제시할 것입니다.

약이나 음식 또는 어떤 물질에 알레르기가 있으면 검사 전에 의료진에게 미리 알려주십시오.

임신을 했거나, 임신을 했을 가능성이 있다면 검사 전에 의료진에게 미리 알려주십시오.

예약 시간에 맞춰 오십시오. 예약 시간보다 30분 더 일찍 오라고 할 수도 있습니다. 단순한 생체검사는 약 15분 정도 걸립니다. 생체검사를 한 개 이상 해야 하거나 엑스레이를 찍어야 할 경우 시간이 더 소비됩니다.

검사 전

- 생체검사 받기 전 1주일 동안은 아스피린이나 이부프로펜을 복용하지 않는다.
- 복용하던 약은 계속 먹어도 되는지 의사에게 물어본다.

검사 중

- 테이블에 누운 다음 병원에서 준 가운을 입는다.
- 생체검사를 할 부위를 찾기 위하여 엑스레이, CT 스캔, 또는 초음파를 사용할 수 있다.
- 검사 부위를 닦아 낸다.
- 피부를 얼얼하게 만드는 약을 바른다. 이 때 약간 따가울 수 있다.
- 부위가 얼얼해지면, 부위에 작은 바늘을 찔러 넣는다. 조직과 세포를 떼어낸다. 경우에 따라서 조직이나 혹을 제거하고 검사하기 위하여 피부를 약간 절개할 수 있다.

- If you feel any discomfort, tell the doctor.
- The needle is then removed.
- Pressure is applied, then a small bandage. If an incision was made, stitches may be placed to close the incision.

After the Test

- You may have bruising, discomfort or swelling at the biopsy site.
- If needed, use over the counter pain medicine that does not contain aspirin.
- Apply an ice pack to the site as needed to reduce swelling and bruising. Do not apply ice directly to the skin. Apply ice for 20 minutes and then take the ice off for at least 30 minutes.
- Avoid strenuous activity and lifting over 5 pounds for 24 hours. You may resume normal activities unless otherwise instructed.
- Test results are sent to your doctor. Your doctor will share the results with you.

Call your doctor if you have:

- Bleeding, drainage, increased swelling, redness or warmth at the site
- Pain not relieved by over the counter pain medicine

Talk to the staff if you have any questions or concerns.

- 검사 중 아프면 의사에게 말하십시오.
- 바늘을 뽑는다.
- 부위를 꼭 누른 다음 작은 반창고를 붙인다. 절개를 했을 경우에는 실로 부위를 꿰맨다.

검사 후

- 생체검사 부위가 멍이 들거나, 아프거나, 부어 오를 수 있다.
- 필요하면 아스피린이 들어있지 않은 비처방 진통제를 복용한다.
- 필요하면 부위에 얼음 찜질로 붓기와 멍을 가라 앉힌다. 피부에 얼음을 직접 대지는 않는다. 20 분 가량 얼음 찜질 후 최소 30 분은 쉬었다 다시 한다.
- 24 시간 동안은 격렬한 활동을 피하고 5 파운드 이상의 물체를 들어올리지 않는다. 별도 지시가 없는 한 그 후 정상 활동을 할 수 있다.
- 검사 결과는 의사에게 보내집니다. 의사가 결과를 알려드릴 것입니다.

다음과 같은 경우 의사에게 연락:

- 부위에서 피가 나거나, 액이 흐르거나, 계속 붓거나, 빨갛거나 뜨끈하다
- 일반 진통제를 먹어도 통증이 계속된다

질문이나 걱정되는 점이 있으면 의료진에게 물어보십시오.