

Biopsy

A biopsy is the removal of pieces of tissue, which are then sent to a lab for testing. A biopsy is most often used to find cancer. Any part of the body, such as the skin, an organ or a lump can be tested. An x-ray, CT scan or ultrasound may be done to locate the biopsy site. A biopsy may be done during surgery. Your doctor will review the results of your biopsy with you at your next visit and talk to you about treatment if needed.

If you have any allergies to medicines, foods or other things, tell the staff before the test.

If you are pregnant or think you might be, tell the staff before the test.

Arrive on time for your test. You may be told to arrive 30 minutes before your appointment time. A simple biopsy takes about 15 minutes. It may take longer if several biopsies or x-rays are needed.

To Prepare

- Do not take aspirin or ibuprofen for one week before the biopsy.
- Check with your doctor about taking your prescription medicines.

During the Test

- You will lie on a table and may wear a hospital gown.
- An x-ray, CT scan or ultrasound may be done to locate the biopsy site.
- The site is cleaned.
- Numbing medicine is put into the skin. This may sting.
- When the site is numb, a small needle is put into the area to be tested. Tissues and cells are removed. In some cases a small incision is made so that tissue or a lump can be removed and tested.
- If you feel any discomfort, tell the doctor.
- The needle is then removed.
- Pressure is applied, then a small bandage. If an incision was made, stitches may be placed to close the incision.

الاختزاع

الاختزاع هو إزالة قطع من النسيج يتم إرسالها إلى أحد المعامل من أجل الاختبار. ويكثر استخدام الاختزاع لاكتشاف مرض السرطان. ويمكن اختبار أي جزء من الجسم، مثل الجلد أو عضو أو ورم. ويمكن استخدام الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية الحاسوبية أو الموجات فوق الصوتية لتحديد موضع الاختزاع، كما يمكن إجراء الاختزاع أثناء الجراحة. وسوف يستعرض الطبيب المعالج نتائج الاختزاع معك في زيارتك التالية كما سيتحدث معك بشأن العلاج إذا لزم الأمر.

إذا كنت تعاني من أي حساسية للأدوية أو الأطعمة أو أشياء أخرى، فالرجاء إخطار طاقم العمل قبل الاختبار.

إذا كنت حاملاً أو تعتقدين أنك كذلك، فالرجاء إخطار طاقم العمل قبل الاختبار.

الوصول في الموعد للاختبار. قد يتم إخطارك بالحضور قبل الوقت المحدد بثلاثين دقيقة. تستغرق عملية الاختزاع البسيطة 15 دقيقة، وقد تستغرق وقتاً أطول إذا كانت هناك حاجة للعديد من عمليات الاختزاع أو الأشعة السينية.

للاستعداد

- تجنب تناول الأسبرين أو الإيبوبروفين لمدة أسبوع قبل الاختزاع.
- راجع الطبيب المعالج بشأن تناول الأدوية الموصوفة لك.

أثناء الاختبار

- سوف تستلقي على طاولة وقد ترتدي الرداء الخاص بالمستشفى.
- يمكن استخدام الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية الحاسوبية أو الموجات فوق الصوتية لتحديد موضع الاختزاع.
- يتم تنظيف الموضع.
- يتم وضع مادة مخدرة على الجلد. وقد يؤدي هذا إلى الإحساس بألم لاسع.
- عندما ينمل الموضع، توضع إبرة صغيرة داخل المنطقة المراد اختبارها. وتتم إزالة الأنسجة والخلايا. وفي بعض الحالات، قد يتم إجراء جرح صغير بحيث يمكن إزالة النسيج أو النتوء واختباره.
- إذا شعرت بعدم الارتياح، فأخبر الطبيب المعالج على الفور.
- تتم بعد ذلك إزالة الإبرة.
- يتم الضغط على الموضع، ثم وضع ضمادة صغيرة عليه. وفي حالة إجراء جرح، فقد تُستخدم غُرز الخياطة لغلاق الجرح.

After the Test

- You may have bruising, discomfort or swelling at the biopsy site.
- If needed, use over the counter pain medicine that does not contain aspirin.
- Apply an ice pack to the site as needed to reduce swelling and bruising. Do not apply ice directly to the skin. Apply ice for 20 minutes and then take the ice off for at least 30 minutes.
- Avoid strenuous activity and lifting over 5 pounds for 24 hours. You may resume normal activities unless otherwise instructed.
- Test results are sent to your doctor. Your doctor will share the results with you.

Call your doctor if you have:

- Bleeding, drainage, increased swelling, redness or warmth at the site
- Pain not relieved by over the counter pain medicine

Talk to the staff if you have any questions or concerns.

بعد الاختبار

- قد تعاني من كدمات أو ألم أو تورم في موضع الاختزاع.
- إذا لزم الأمر، استخدم دواء لتخفيف الألم غير خاضع لإشراف الطبيب بشرط ألا يتضمن الأسبرين.
- ضع كمادة تجمدية على الموضع حسب الحاجة لتقليل التورم والكدمات. لا تضع الثلج مباشرة على الجلد. واستخدم الثلج لمدة 20 دقيقة ثم استبعده 30 دقيقة على الأقل.
- تجنب النشاط العنيف ورفع ما يزيد عن 5 أرطال لمدة 24 ساعة. ويمكنك بعدها استئناف الأنشطة العادية ما لم يتم إخطارك بخلاف ذلك.
- يتم إرسال نتائج الاختبار إلى الطبيب المعالج. وسوف يشارك الطبيب هذه النتائج معك.

اتصل بالطبيب المعالج إذا كنت تعاني من:

- نزيف أو نزح أو زيادة الورم أو الاحمرار أو الحرارة بالموضع
- ألم لم يسكن بأدوية تلطيف الألم غير الخاضعة لإشراف الطبيب

تحدث إلى طاقم العمل إذا كانت لديك أية أسئلة أو مخاوف.