

Amniocentesis

Amniocentesis is a test of amniotic fluid. This fluid is around your baby in your uterus. The doctor will remove a small sample of the fluid with a needle. This test checks your baby for birth defects.


There are some risks with this test.

- A leak or infection of the amniotic fluid
- The needle touching the baby
- Early delivery
- Miscarriage

Arrive on time for your test. Plan on this test taking about 1 hour.

During the Test

- You will wear a hospital gown.
- You lie on your back with your stomach uncovered.
- Your stomach is washed.
- Your doctor uses ultrasound to see your baby and find safe pockets of amniotic fluid. An ultrasound is a picture of your baby using sound waves.
- Your doctor may numb the skin where the needle goes in. You may feel a sting.
- When the needle enters the uterus, you may feel cramping.



एमनियोसेन्टेसिस

एमनियोटिक फ्लूइड की जाँच को एमनियोसेन्टेसिस कहते हैं। यह फ्लूइड गर्भाशय में पल रहे बच्चे के चारों ओर होता है। डॉक्टर एक छोटी सुई से इस फ्लूइड का थोड़ा सा नमूना निकाल लेते हैं। यह परीक्षण आपके बच्चे की जन्मजात कमियों और विकृतियों का पता लगाता है।


इस परीक्षण के कुछ जोखिम भी हैं :-

- एमनियोटिक फ्लूइड में रिसाव या संक्रमण
- सुई बच्चे को लगना
- समय से पूर्व प्रसव
- गर्भपात

अपनी जाँच के लिये समय पर आयेँ। इस जाँच में लगभग एक घंटे का समय लग सकता है।

परीक्षण के दौरान

- आप अस्पताल का गाउन पहनेँगे।
- आप अपनी पीठ के बल लेट जाएँगी और आपका पेट अनावृत्त होगा।
- आपका पेट धोया जाता है।
- आपका डॉक्टर आपके बच्चे को देखने के लिये अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करता है तथा एमनियोटिक फ्लूइड निकालने के लिये सुरक्षित स्थान की तलाश करता है। अल्ट्रासाउंड ध्वनि तरंगों के माध्यम से आपके बच्चे की तस्वीर उतारता है।
- आपका डॉक्टर जहाँ सुई लगाएगा वहाँ की त्वचा को सुन्न कर सकता है। आपको वहाँ दर्द महसूस हो सकता है।
- जब सुई गर्भाशय के भीतर जाएगी तो आप दर्द महसूस कर सकती हैं।



Amniocentesis. Hindi.

- The doctor takes out a small sample of the fluid and removes the needle. The needle is in for less than 1 minute.
- A monitor is placed on your stomach for 15-30 minutes to check your baby's heartbeat.
- Your doctor will get your test results in about 2 weeks. Your doctor will share the results with you.

After the Test

- Rest at home today.
- Drink plenty of liquids.
- If you have cramping, lie on your left side.

Call your doctor **right away** if you have:

- Severe cramping
- Fluid leaking from the vagina
- Bleeding from the vagina
- Fever
- Your baby is less active
- Other concerns

Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.

- डॉक्टर फ्लूइड का नमूना लेकर सुई निकाल लेता है। सुई एक मिनट से भी कम समय तक भीतर रहती है।
- आपके बच्चे की हृदय गति जानने के लिये 15–30 मिनट की अवधि तक एक मॉनीटर आपके पेट पर रखा जाता है।
- आपका डॉक्टर दो सप्ताह के भीतर आपकी जाँच का परिणाम प्राप्त करेगा। आपका डॉक्टर जाँच के परिणाम के बारे में आपसे बातचीत करेगा।

जाँच के बाद

- घर में आराम करें।
- अच्छी मात्रा में पेयपदार्थ लें।
- यदि आपको दर्द या ऐंठन महसूस हो तो बायीं करवट लेट जाएं।

डॉक्टर से फौरन बात करें यदि :

- कोई दर्द या अत्यधिक चुभन हो।
- योनि से स्राव हो रहा हो।
- योनि से खून जा रहा हो।
- बुखार हो।
- यदि गर्भस्थ शिशु कम सक्रिय लग रहा हो।
- या अन्य कोई बात हो।

यदि आपके मन में कोई प्रश्न अथवा चिंता है तो अपने डॉक्टर या नर्स से बात करें।

Amniocentesis. Hindi.

5/2005. Developed through a partnership of The Ohio State University Medical Center, Mount Carmel Health and OhioHealth, Columbus, Ohio. Available for use as a public service without copyright restrictions at www.healthinfotranslations.com.