

# Amniocentesis

Amniocentesis is a test of amniotic fluid. This fluid is around your baby in your uterus. The doctor will remove a small sample of the fluid with a needle. This test checks your baby for birth defects.


There are some risks with this test.

- A leak or infection of the amniotic fluid
- The needle touching the baby
- Early delivery
- Miscarriage

**Arrive on time for your test.** Plan on this test taking about 1 hour.

## During the Test

- You will wear a hospital gown.
- You lie on your back with your stomach uncovered.
- Your stomach is washed.
- Your doctor uses ultrasound to see your baby and find safe pockets of amniotic fluid. An ultrasound is a picture of your baby using sound waves.



# 양수 검사

양수 검사는 임산부의 양수 검사를 말합니다. 양수는 자궁 안에 들어있는 태아를 둘러싸고 있습니다. 의사는 주사를 집어 넣어 약간의 샘플을 뽑아낼 것입니다. 이 검사는 태아가 혹시 선천적 결함이 있는가를 확인합니다.


이 검사를 할 때 약간의 위험이 따릅니다.

- 양수의 누수나 세균 감염
- 바늘이 아기를 건드릴 가능성
- 조기 분만
- 유산

검사받는 날 제시간에 도착하십시오. 약 1 시간정도 걸릴 것으로 예상하십시오.

## 검사 중

- 병원 가운을 입을 것입니다.
- 천장을 보고 복부를 노출한채 눕습니다.
- 복부를 닦아냅니다.
- 초음파를 이용하여 아기를 보면서 안전한 양수 주머니를 찾습니다. 초음파는 음파를 이용하여 찍은 태아의 사진입니다.



Amniocentesis. Korean.

- Your doctor may numb the skin where the needle goes in. You may feel a sting.
- When the needle enters the uterus, you may feel cramping.
- The doctor takes out a small sample of the fluid and removes the needle. The needle is in for less than 1 minute.
- A monitor is placed on your stomach for 15-30 minutes to check your baby's heartbeat.
- Your doctor will get your test results in about 2 weeks. Your doctor will share the results with you.

### **After the Test**

- Rest at home today.
- Drink plenty of liquids.
- If you have cramping, lie on your left side.

Call your doctor **right away** if you have:

- Severe cramping
- Fluid leaking from the vagina
- Bleeding from the vagina
- Fever
- Your baby is less active
- Other concerns

**Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.**

- 주사를 찌르는 피부를 약간 마비시키기도 합니다. 바늘이 들어갈 때 따끔할 것입니다.
- 바늘이 자궁을 통과할 때 약간 경련을 느낄 수 있습니다.
- 의사는 양수를 채취한 후 바늘을 뽑을 것입니다. 바늘이 들어가 있는 시간은 1 분도 되지 않을 것입니다.
- 모니터를 복부에 15-30 분가량 놓고 태아의 심장 박동을 검사할 것입니다.
- 약 2 주 후면 결과가 나옵니다. 의사가 결과를 환자와 상의할 것입니다.

## 검사 후

- 검사 받은 날은 집에서 쉬십시오.
- 물을 충분히 마시십시오.
- 경련이 있으면 왼쪽으로 누우십시오.

아래와 같은 경우 의사에게 즉시 연락하십시오:

- 심한 경련
- 질에서 액체가 흘러 나온다
- 질에서 피가 나온다
- 열이 있다
- 태아가 잘 움직이지 않는다
- 그밖에 문제

질문이나 문제가 있으시면 의사나 간호사에게 말하십시오.

Amniocentesis. Korean.

5/2005. Developed through a partnership of The Ohio State University Medical Center, Mount Carmel Health and OhioHealth, Columbus, Ohio. Available for use as a public service without copyright restrictions at [www.healthinfotranslations.com](http://www.healthinfotranslations.com).