

Amniocentesis

Amniocentesis is a test of amniotic fluid. This fluid is around your baby in your uterus. The doctor will remove a small sample of the fluid with a needle. This test checks your baby for birth defects.


There are some risks with this test.

- A leak or infection of the amniotic fluid
- The needle touching the baby
- Early delivery
- Miscarriage

Arrive on time for your test. Plan on this test taking about 1 hour.

During the Test

- You will wear a hospital gown.
- You lie on your back with your stomach uncovered.
- Your stomach is washed.
- Your doctor uses ultrasound to see your baby and find safe pockets of amniotic fluid. An ultrasound is a picture of your baby using sound waves.



Амніоцентез

Амніоцентез – це аналіз навколоплідних вод. Ці води оточують Вашу дитину у Вашій матці. Лікар відбере невеликий зразок цих вод за допомогою голки. Цей аналіз дозволяє виявити вроджені дефекти Вашої дитини.


З цим аналізом пов'язаний деякий ризик.

- Вітік або зараження навколоплідних вод
- Голка може торкнутися дитини
- Передчасні пологи
- Викидень

Не запізнюйтесь на це обстеження. Заплануйте на це обстеження біля 1 години.

Під час обстеження

- Вам запропонують надягти лікарняний одяг.
- Ви ляжете на спину з непокритим животом.
- Ваш живіт обмиють.
- Ваш лікар буде використовувати ультразвуковий прилад для того, щоб побачити Вашу дитину та знайти безпечні ділянки з навколоплідними водами. Ультразвуковий прилад дає зображення Вашої дитини за допомогою звукових хвиль.



Amniocentesis. Ukrainian.

- Your doctor may numb the skin where the needle goes in. You may feel a sting.
- When the needle enters the uterus, you may feel cramping.
- The doctor takes out a small sample of the fluid and removes the needle. The needle is in for less than 1 minute.
- A monitor is placed on your stomach for 15-30 minutes to check your baby's heartbeat.
- Your doctor will get your test results in about 2 weeks. Your doctor will share the results with you.

After the Test

- Rest at home today.
- Drink plenty of liquids.
- If you have cramping, lie on your left side.

Call your doctor **right away** if you have:

- Severe cramping
- Fluid leaking from the vagina
- Bleeding from the vagina
- Fever
- Your baby is less active
- Other concerns

Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.

- Ваш лікар може знеболити ділянку шкіри, в яку буде вводиться голка. Ви можете відчувати гострий біль.
- В момент, коли голка ввійде в матку, Ви можете відчувати перейми.
- Лікар відбере невеликий зразок вод і витягне голку. Голка буде перебувати в матці менше однієї хвилини.
- На Ваш живіт на 15–30 хвилин буде поміщений монітор для перевірки серцебиття Вашої дитини.
- Ваш лікар отримає результати Вашого аналізу приблизно за два тижні. Ваш лікар пояснить Вам ці результати.

Після обстеження

- Відпочиньте сьогодні вдома.
- Пийте багато рідини.
- Якщо Ви відчуєте перейми, ляжте на лівий бік.

Негайно зателефонуйте своєму лікарю, якщо у Вас:

- Сильні перейми
- Рідкі виділення з піхви
- Виділення крові з піхви
- Підвищена температура
- Ваша дитина менш активна
- Інші побоювання.

Якщо у Вас є питання або сумніви, зверніться до Вашого лікаря або медичної сестри.

Amniocentesis. Ukrainian.

5/2005. Developed through a partnership of The Ohio State University Medical Center, Mount Carmel Health and OhioHealth, Columbus, Ohio. Available for use as a public service without copyright restrictions at www.healthinfotranslations.com.