

# Barium Swallow


A barium swallow is an x-ray that checks for problems in your throat, esophagus, stomach and small intestine. You drink a white chalky liquid called barium to get pictures on x-rays.

**If you are breastfeeding, pregnant, or think you might be, tell the staff before the x-ray is taken.**

**Arrive on time for you test.** The test takes about 15-45 minutes. You may need to stay for up to 6 hours for more x-rays if your small intestine is being looked at.

## To Prepare

- Do not eat or drink anything, including water, after midnight before the test.
- Do not smoke after midnight before the test.
- If you need to take your medicines the morning of the test, take them with sips of water only.



# Déglutition barytée

Une déglutition barytée est une radiographie qui permet d'identifier les problèmes au niveau de votre gorge, votre œsophage, votre estomac et votre intestin grêle. Vous devrez boire un liquide blanc crayeux appelé baryum afin de prendre des clichés par radiographie.


**Si vous allaitez, êtes enceinte ou pensez l'être, informez le personnel médical avant de prendre les radiographies.**

**Arrivez à l'heure pour votre examen.**

Il dure environ 15 à 45 minutes. Il est possible que vous deviez rester jusqu'à 6 heures maximum pour prendre d'autres clichés en cas d'examen de votre intestin grêle.

## Préparation

- Ne mangez et ne buvez rien, y compris de l'eau, après minuit avant l'examen.
- Ne fumez pas après minuit avant l'examen.
- Si vous devez prendre vos médicaments le matin de l'examen, prenez-les avec des petites gorgées d'eau uniquement.



## **During the Test**

- You will wear a hospital gown.
- You are given 1 or 2 barium drinks. The drink tastes chalky and may be flavored.
- X-rays are taken as the barium flows down your esophagus into your stomach. You may need to stand or lie on a table for the x-rays. The table is moved in many positions. As you move, the barium coats the inside of your stomach and intestines. More x-rays are taken as the barium moves through your body.
- If you are to have x-rays of your small intestine, it may take up to 6 hours to complete your test.

## **After the Test**

- Your stool will be light colored for 2-3 days after the test.
- Drink 6-8 glasses of liquids after the test. This will help remove the barium from your body and keep you from being constipated.
- Test results are sent to your doctor. Your doctor will share the results with you.

## **Pendant l'examen**

- Vous porterez une chemise d'hôpital.
- On vous donnera 1 ou 2 doses de baryum à boire. La boisson a un goût de craie et peut être parfumée.
- Les radiographies sont prises lorsque le baryum descend dans votre œsophage pour aller dans votre estomac. Il est possible que vous deviez vous tenir debout ou vous allonger sur une table pendant les radiographies. La table est déplacée dans différentes positions. Lorsque vous bougez, le baryum recouvre l'intérieur de votre estomac et de vos intestins. D'autres radiographies sont prises lorsque le baryum se déplace dans votre corps.
- Si des radiographies de votre intestin grêle doivent être prises, l'examen pourra durer jusqu'à 6 heures.

## **Après l'examen**

- Vos selles seront légèrement colorées pendant 2 à 3 jours après l'examen.
- Buvez 6 à 8 verres de liquides après l'examen. Ceci facilitera l'élimination du baryum de votre organisme et vous empêchera d'être constipé(e).
- Les résultats de l'examen seront envoyés à votre médecin. Ce dernier les commentera avec vous.

Call your doctor if you have:

- Barium in your stool 3 days after the test
- A thin stool or notice a change in your bowel habits
- Stool that is not normal in 3 days
- Pain in your lower abdomen or stomach

Call your doctor **right away** if you:

- Cannot stop vomiting
- See blood when you vomit or have blood in your stool

**Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.**

Appelez votre médecin si vous avez :

- Du baryum dans vos selles 3 jours après l'examen.
- Des selles fines ou si vous constatez des changements dans vos habitudes pour aller à la selle.
- Des selles qui ne sont pas normales au bout de 3 jours
- Une douleur dans le bas ventre ou l'estomac

Appelez **immédiatement** votre médecin si :

- Vous vomissez constamment
- Vous voyez du sang lorsque vous vomissez ou si vos selles contiennent du sang.

**Adressez-vous à votre médecin ou votre infirmière si vous avez des questions ou des inquiétudes.**