

Colposcopy

A colposcopy is a test done to check your vagina and cervix for abnormal cells. You may have a colposcopy if a pap smear shows cells that look abnormal. The doctor uses a magnifying scope to check for abnormal tissue of the vagina and cervix. A small tissue sample, called a biopsy, may be removed to be checked in the lab.

Arrive on time for your test. The test takes about 15-20 minutes. Plan to be here about 2 hours.

During the Test

- You may wear a hospital gown.
- You are helped onto the exam table. Lie down on your back and put your feet in the stirrups.
- The cervix is covered with a weak vinegar solution. This makes the abnormal cells show up.
- The doctor checks your vagina and cervix for abnormal cells.
- If your doctor wants to take tissue samples from the vagina, you will feel some pain or strong cramps. This will go away in about 1 minute.
- Any bleeding is stopped with pressure and a chemical solution.

Your doctor or nurse will contact you in about 2 weeks with your test results and to discuss treatment if needed.

질확대경 검사

질확대경 검사는 질과 자궁 경부에 비정상적인 세포가 있는지 확인하는 검사입니다. 자궁경부암 검사 결과 비정상적인 세포가 의심되면 질확대경 검사를 받게 됩니다. 의사는 확대경을 이용하여 질과 자궁경부에 비정상적인 조직이 있는가 확인합니다. 조직을 약간 떼어내어(biopsy) 임상실험실로 보내어 확인합니다.

검사 받는 날 제 시간에 도착하십시오. 검사는 15-20 분 가량 걸립니다. 약 2 시간 정도 병원에 있을 것으로 예상하십시오.

검사 중

- 병원 가운데로 갈아 입는다.
- 검사대로 안내를 받는다. 등을 뒤로 하고 눕고 다리를 스테업에 걸쳐 놓는다.
- 자궁경부에 약한 식초액을 칠한다. 이렇게 하면 비정상적인 세포가 눈에 보인다.
- 질과 자궁경부에 비정상적인 세포가 있는가 확인한다.
- 의사가 질에서 조직 샘플을 떼어낼 때는 통증이나 강한 경련을 느낀다. 1분이면 통증이 사라진다.
- 출혈은 약간의 압박과 화학용액을 사용하면 중단된다.

의사나 간호사는 검사 2 주 후쯤 환자에게 결과를 알리고 필요하면 치료 방법을 강구할 것입니다.

Your Care at Home

- Do not have sexual intercourse, use tampons or douche for 24 hours.
- If you had a biopsy, you may have a small amount of bloody vaginal discharge for a day. You may wear a pad.
- You may take a shower. Do not take a tub bath for 3 days. This increases your chance for infection.

Call your doctor **right away** if you have:

- A large amount of bleeding where you soak a pad in an hour
- Severe abdominal cramps or pain
- Chills or fever of 101 degrees F or 38 degrees C
- Vaginal discharge that has an strange odor

Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.

집에서 몸 관리

- 검사 후 24 시간 동안은 성관계를 피하고 탐폰이나 질세척기 사용을 중단한다.
- 조직 검사를 위하여 조직을 떼어 냈으면 질에서 약간의 출혈이 하루쯤 있을 수 있다. 패드를 사용한다.
- 샤워를 해도 된다. 욕조 목욕은 3 일간 금한다. 욕조 목욕을 하면 감염되기 쉽다.

다음과 같은 경우 의사에게 즉시 연락:

- 한 시간만에 패드가 흠뻑 젖을 정도로 출혈
- 심한 복부 경련이나 통증
- 오한이나 열이 섭씨 38 도(화씨 101 도)
- 질 분비물에서 이상한 냄새가 난다

의문사항이나 신경 쓰이는 문제가 있으면 의사나 간호사와 상담하십시오.