

Colposcopy

A colposcopy is a test done to check your vagina and cervix for abnormal cells. You may have a colposcopy if a pap smear shows cells that look abnormal. The doctor uses a magnifying scope to check for abnormal tissue of the vagina and cervix. A small tissue sample, called a biopsy, may be removed to be checked in the lab.

Arrive on time for your test. The test takes about 15-20 minutes. Plan to be here about 2 hours.

During the Test

- You may wear a hospital gown.
- You are helped onto the exam table. Lie down on your back and put your feet in the stirrups.
- The cervix is covered with a weak vinegar solution. This makes the abnormal cells show up.
- The doctor checks your vagina and cervix for abnormal cells.
- If your doctor wants to take tissue samples from the vagina, you will feel some pain or strong cramps. This will go away in about 1 minute.
- Any bleeding is stopped with pressure and a chemical solution.

Your doctor or nurse will contact you in about 2 weeks with your test results and to discuss treatment if needed.

Кольпоскопія

Кольпоскопія - це обстеження піхви і шийки матки з метою виявлення аномальних клітин. Вам може знадобитися проведення кольпоскопії, якщо мазок Папаніколау виявив клітини, що виглядають як аномальні. Лікар використовує збільшувачий прилад для виявлення аномальних тканин піхви і шийки матки. Для перевірки в лабораторних умовах робиться відбір невеликого фрагмента тканини, що називається біопсією.

Не запізнюйтесь на це обстеження. Саме обстеження займе близько 15-20 хвилин. Заплануйте близько 2 годин для перебування в лікарні.

Під час обстеження

- Ви можете надягнути лікарняний одяг.
- Вам допоможуть піднятися на медичний стіл. Ви ляжете на спину і покладете ноги в підставки для ніг.
- На шийку матки буде нанесений слабкий оцтовий розчин. При цьому аномальні клітини стануть видимими.
- Лікар огляне піхву і шийку матки на предмет наявності аномальних клітин.
- Якщо лікареві знадобиться відібрати невеликі зразки тканини з піхви, Ви можете відчути певний біль або сильний спазм. Це пройде приблизно за 1 хвилину.
- Будь-яка кровотеча припиняється за допомогою тиску і хімічного розчину.

Ваш лікар або медсестра зв'яжуться з Вами приблизно за 2 тижні, коли будуть готові результати обстеження і, в разі потреби, обговорять з Вами способи лікування.

Your Care at Home

- Do not have sexual intercourse, use tampons or douche for 24 hours.
- If you had a biopsy, you may have a small amount of bloody vaginal discharge for a day. You may wear a pad.
- You may take a shower. Do not take a tub bath for 3 days. This increases your chance for infection.

Call your doctor **right away** if you have:

- A large amount of bleeding where you soak a pad in an hour
- Severe abdominal cramps or pain
- Chills or fever of 101 degrees F or 38 degrees C
- Vaginal discharge that has an strange odor

Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.

Медичний догляд вдома

- Утримуйтеся від сексуальних контактів, використання тампонів або спринцювання протягом 24 годин.
- Якщо Вам зробили біопсію, можливо у Вас будуть незначні піхвові виділення протягом дня. Можливо, Вам знадобиться використати прокладку.
- Ви можете приймати душ. Не приймайте ванну протягом 3 днів. Це збільшує ризик виникнення інфекцій.

Негайно зателефонуйте своєму лікарю, якщо у Вас:

- Сильні виділення крові, що насичують прокладку протягом години.
- Сильні спазми або біль у животі.
- Озноб, або температура 101 градус F або 38 градусів C.
- Піхвові виділення з незвичним запахом.

Якщо у Вас виникають питання або сумніви, зверніться до Вашого лікаря або медичної сестри.