


LEEP (Loop Electrosurgical Excision Procedure)

If your pap test was abnormal, you may need LEEP as a treatment. LEEP is done to remove tissue from the cervix.

Arrive on time for your treatment. It takes about 15-20 minutes. Plan on being here at least 1 hour.




LEEP

Процедура петльової електрорезекції

Якщо мазок Папаніколау виявив аномалію, як засіб лікування Вам може знадобитися проведення петльової електрохірургічної резекції. Петльова електрохірургічна резекція проводиться для видалення тканини з шийки матки.

Не запізнюйтесь на прийом. Він триватиме близько 15-20 хвилин. Заплануйте близько 1 години для перебування в лікарні.



Your Treatment

- Your feet will be placed in stirrups. The doctor will use an instrument called a speculum that will be put into your vagina to keep it open. You may feel some pressure.
- Medicine is used to numb your cervix.
- A solution is put on your cervix to show abnormal cells.
- A magnifying instrument is used to get a close up view of your cervix.
- A fine wire loop is used to remove the abnormal tissue.
- The tissue will be sent to a lab for testing.

Your Care After Treatment

Your cervix should heal completely in a few weeks.

- Rest for the next 2 days.
- You may have some mild cramping.
- You may have some vaginal discharge for about 2 weeks. This is like having a period.

Do not use tampons, have sexual intercourse or douche for 4 weeks. This reduces your risk of bleeding and allows healing to occur.

Call your doctor **right away** if you have:

- Bleeding that soaks a pad in 1 hour
- Severe abdominal cramps or pain
- Chills or fever of 100.5 degrees F or 38 degrees C
- Vaginal discharge that has a foul odor
- Pain not controlled by over the counter pain medicine. Do not take aspirin.

Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.

Ваше лікування

- Ваші ноги будуть поміщені в стремена. Лікар використовує інструмент, що називається розширювачем, який буде введений у піхву для того, щоб тримати її у відкритому стані. Ви можете відчути деякий тиск.
- Для знеболювання шийки матки будуть використані ліки.
- На шийку матки буде нанесений розчин, який виявить аномальні клітки.
- Для детального візуального огляду шийки матки буде використаний збільшувальний прилад.
- Для видалення аномальної тканини використовується тонка дротова петля.
- Шматочок тканини буде посланий у лабораторію для аналізу.

Догляд за Вами після лікування

Шийка матки повністю заживе через кілька тижнів.

- Відпочиньте протягом наступних 2 днів.
- У Вас можуть бути помірні спазмові відчуття.
- Протягом 2 тижнів у Вас можуть бути невеликі піхвові виділення. Це буде приблизно як при місячних.

Утримайтеся від використання тампонів, сексуальних контактів або прийому душу на протязі 4 тижнів. Це зменшить ризик кровотечі й прискорить загоєння.

Негайно зателефонуйте своєму лікарю, якщо у Вас:

- Кровотеча, від якої прокладка насичується за 1 годину.
- Сильні спазми або біль у животі.
- Озноб, або температура 100,5 градусів F або 38 градусів C.
- Піхвові виділення із запахом гною
- Біль, який не проходить після прийому знеболюючих ліків, які відпускаються без рецепта. Не приймайте аспірин.

Якщо у Вас виникають питання або сумніви, зверніться до Вашого лікаря або медичної сестри.

2/2006. Developed through a partnership of The Ohio State University Medical Center, Mount Carmel Health and OhioHealth, Columbus, Ohio. Available for use as a public service without copyright restrictions at www.healthinfotranslations.com.

LEEP. Ukrainian