


# LEEP (Loop Electrosurgical Excision Procedure)

If your pap test was abnormal, you may need LEEP as a treatment. LEEP is done to remove tissue from the cervix.


**Arrive on time for your treatment.** It takes about 15-20 minutes. Plan on being here at least 1 hour.



# एलईईपी (लूप से विद्युतशल्यक उच्छेदन प्रक्रिया / लूप इलैक्ट्रोसर्जिकल एक्सीजन प्रोसीजर)

यदि आपका पैप परीक्षण अपसामान्य था, तो आपको उपचार के रूप में एलईईपी की ज़रूरत पड़ सकती है। एलईईपी गर्भाशय ग्रीवा में से ऊतक निकालने के लिए की जाती है।

**अपने उपचार के लिए समय पर आएँ।** इसमें लगभग 15–20 मिनट लगते हैं। यहाँ पर कम से कम 1 घण्टा ठहरने की योजना बनाकर आएँ।



## **Your Treatment**

- Your feet will be placed in stirrups. The doctor will use an instrument called a speculum that will be put into your vagina to keep it open. You may feel some pressure.
- Medicine is used to numb your cervix.
- A solution is put on your cervix to show abnormal cells.
- A magnifying instrument is used to get a close up view of your cervix.
- A fine wire loop is used to remove the abnormal tissue.
- The tissue will be sent to a lab for testing.

## **Your Care After Treatment**

Your cervix should heal completely in a few weeks.

- Rest for the next 2 days.
- You may have some mild cramping.
- You may have some vaginal discharge for about 2 weeks. This is like having a period.

Do not use tampons, have sexual intercourse or douche for 4 weeks. This reduces your risk of bleeding and allows healing to occur.

Call your doctor **right away** if you have:

- Bleeding that soaks a pad in 1 hour
- Severe abdominal cramps or pain
- Chills or fever of 100.5 degrees F or 38 degrees C
- Vaginal discharge that has a foul odor
- Pain not controlled by over the counter pain medicine. Do not take aspirin.

**Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.**

## आपका उपचार

- आपके पैरों को रकाब (स्ट्रिप) में रखा जाएगा। चिकित्सक 'स्पेक्युलम' नामक एक यंत्र का उपयोग करेगा जिसे आपकी योनि को खुला रखने के लिए उसमें रखा जायेगा। आपको थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है।
- आपकी गर्भाशय ग्रीवा को सुन्न करने के लिए दवा का उपयोग किया जायेगा।
- अपसामान्य कोषिकाएँ दिखाने के लिए आपकी ग्रीवा पर एक घोल (सॉल्युषन) लगाया जायेगा।
- आपकी गर्भाशय ग्रीवा को नजदीक से देख सकने के लिए आवर्धक (मैग्नीफाइंग) साधन का उपयोग किया जायेगा।
- अपसामान्य ऊतक को निकालने के लिए एक पतले तार की लूप का उपयोग किया जायेगा।
- ऊतक को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा।

## उपचार के बाद आपकी देखभाल

आपकी गर्भाशय ग्रीवा कुछ हफ्तों में पूरी तरह से अच्छी हो जानी चाहिए।

- अगले 2 दिनों तक आराम कीजिए।
- आपको हल्की-सी एंठन हो सकती है।
- करीब 2 हफ्ते तक आपको कुछ योनिक बहाव हो सकता है। यह रजोस्त्राव होने की तरह है। 4 हफ्तों तक फाहे (टैम्पून्स) का उपयोग न करें, संभोग न करें या डूष न लें। इससे आपको रक्तस्त्राव होने का खतरा कम होता है और आप अच्छी हो सकती हैं।

अपने चिकित्सक को **फौरन** बुलाएँ यदि आपको ऐसा हो:

- रक्तस्त्राव जिससे 1 घण्टे में एक पैड भीग जाता है
- पेटमें तीव्र एंठन या दर्द
- कंपकंपी या 100.5 डिग्री F या 38 डिग्री C बुखार
- बदबूवाला योनिक बहाव
- दर्द प्रतिरोधी दवा द्वारा काबू में न आनेवाला दर्द। एस्पिरिन न लें।

यदि आपका कोई प्रश्न या चिंता हो, अपने चिकित्सक या नर्स से बात करें।