


# LEEP (Loop Electrosurgical Excision Procedure)

If your pap test was abnormal, you may need LEEP as a treatment. LEEP is done to remove tissue from the cervix.

**Arrive on time for your treatment.** It takes about 15-20 minutes. Plan on being here at least 1 hour.




# LEEP

## (Technique d'excision électrochirurgicale à l'anse)

Si votre frottis vaginal est anormal, il se peut que deviez subir une LEEP. La LEEP est réalisée pour prélever des tissus du col de l'utérus.

**Arrivez à l'heure pour votre intervention.** Elle dure environ 15 à 20 minutes. Prévoyez un créneau d'1 heure minimum.



## **Your Treatment**

- Your feet will be placed in stirrups. The doctor will use an instrument called a speculum that will be put into your vagina to keep it open. You may feel some pressure.
- Medicine is used to numb your cervix.
- A solution is put on your cervix to show abnormal cells.
- A magnifying instrument is used to get a close up view of your cervix.
- A fine wire loop is used to remove the abnormal tissue.
- The tissue will be sent to a lab for testing.

## **Your Care After Treatment**

Your cervix should heal completely in a few weeks.

- Rest for the next 2 days.
- You may have some mild cramping.
- You may have some vaginal discharge for about 2 weeks. This is like having a period.

Do not use tampons, have sexual intercourse or douche for 4 weeks. This reduces your risk of bleeding and allows healing to occur.

Call your doctor **right away** if you have:

- Bleeding that soaks a pad in 1 hour
- Severe abdominal cramps or pain
- Chills or fever of 100.5 degrees F or 38 degrees C
- Vaginal discharge that has a foul odor
- Pain not controlled by over the counter pain medicine. Do not take aspirin.

**Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.**

## **Votre intervention**

- On placera vos pieds dans des étriers. Le médecin utilisera un instrument appelé spéculum qui sera introduit dans votre vagin pour le maintenir ouvert. Vous pourrez ressentir une pression.
- Un médicament sera utilisé pour anesthésier le col de votre utérus.
- Une solution permettant de révéler la présence de cellules anormales sera placée sur votre col.
- Un instrument grossissant est utilisé pour avoir une vue rapprochée de votre col.
- Un fil fin en forme de boucle sera utilisé pour retirer les tissus anormaux.
- Les tissus seront envoyés à un laboratoire pour y être analysés.

## **Votre traitement après l'intervention**

Votre col devrait être totalement guéri en quelques semaines.

- Reposez-vous pendant les 2 jours suivant l'intervention.
- Vous pourrez ressentir de légères douleurs abdominales.
- Vous pourrez constater un écoulement vaginal pendant environ 2 semaines. Cela ressemblera à une période de règles.

N'utilisez pas de tampons, n'ayez pas de rapports sexuels ou n'effectuez pas de douche vaginale pendant 4 semaines. Cela réduira vos risques de saignements et vous permettra de mieux guérir.

Appelez **immédiatement** votre médecin si vous avez :

- Des saignements qui imbibent une serviette hygiénique en 1 heure
- Des crampes ou des douleurs abdominales sévères
- Des frissons ou une fièvre de 38 degrés C (100.5 degrés F)
- Un écoulement vaginal avec une odeur nauséabonde
- Une douleur qui ne disparaît pas avec des antalgiques délivrés sans ordonnance. Ne prenez pas d'aspirine.

**Parlez à votre médecin ou votre infirmière si vous avez des questions ou des inquiétudes.**