


# Middle Ear Infection

Middle ear infection is called otitis media. This infection is caused when the fluid draining from your ear gets blocked. This may happen when you have a cold, allergy or the flu. The fluid build-up lets bacteria grow and puts pressure on your eardrum.

## Signs

- Pain
- Fever
- Drainage
- Hearing loss



## Your Care

- Your doctor will look at your ears and ask you about your signs.
- Antibiotic medicine may be ordered. Take all of your medicine as directed.
- You may use a heating pad on a **low** setting.
- Do not put anything in your ears including liquids, herbs or cotton-tipped applicators unless directed to by your doctor. They can block your ear canal, causing a loss of hearing or infection.

Call your doctor **right away** if you have:

- Pain
- Fever
- Drainage that gets worse
- Hearing loss

**Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.**


7/2005. Developed through a partnership of The Ohio State University Medical Center, Mount Carmel Health and OhioHealth, Columbus, Ohio. Available for use as a public service without copyright restrictions at [www.healthinfotranslations.com](http://www.healthinfotranslations.com).

# Запалення середнього вуха

Запалення середнього вуха називається середнім отитом. Цю інфекцію спричиняє закупорка рідини, що виходить із Вашого вуха. Це може бути викликано застудою, алергією або грипом. Накопичення рідини спричиняє розмноження бактерій і збільшення тиску на барабанні перетинки.

## Ознаки

- Біль
- Підвищена температура
- Витікання рідини
- Втрата слуху



## Медичний догляд за Вами

- Лікар огляне Ваші вуха і запитатиме Вас про симптоми.
- Вам можуть призначити приймання антибіотиків. Приймайте всі ліки відповідно до призначення.
- Ви можете використовувати грілку, установлену на мінімальний нагрів.
- Не поміщайте нічого у вуха, включаючи рідину, трави або аплікатори з ватним наконечником, якщо тільки це не запропоновано Вашим лікарем. Вони можуть заблокувати вушний канал, спричинивши втрату слуху або зараження.

**Негайно** зателефонуйте своєму лікарю, якщо у Вас:

- Біль
- Підвищена температура
- Збільшення витоку рідини
- Втрата слуху

**Якщо у Вас є питання або сумніви, зверніться до Вашого лікаря або медичної сестри.**

Middle Ear Infection. Ukrainian.

7/2005. Developed through a partnership of The Ohio State University Medical Center, Mount Carmel Health and OhioHealth, Columbus, Ohio. Available for use as a public service without copyright restrictions at [www.healthinfotranslations.com](http://www.healthinfotranslations.com).