

## Fact Sheet

# ANTHRAX: What You Need to Know

### What Is Anthrax?

Anthrax is a serious disease caused by bacteria that forms spores. Anthrax can make you sick by getting into your skin, lungs or digestive system. It can be deadly if untreated.

### How Do You Get Anthrax?

People can get anthrax from touching or eating an infected animal or breathing in spores from an infected animal. Anthrax can also be used as a weapon. In 2001, 22 people got sick when anthrax was put into the mail.

You cannot catch anthrax from another person or spread it to others.

### What Happens If I Get Anthrax?

People usually get sick within 1 to 7 days of exposure to anthrax, but if it is in your lungs it may take 42 days before you get sick.

It may cause your skin to blister or have sores. You may have a sore throat, fever, headache, cough and breathing problems.

You will need to be treated with medicine because anthrax can cause serious illness or death.

### How Is Anthrax Treated?

There is no way to test for anthrax before you get sick.

Antibiotics are used to treat all types of anthrax.

Health-care workers will give you medicine (doxycycline or ciprofloxacin). This medicine can help prevent an anthrax infection, even if you don't feel sick.

You may have to take this medicine for 60 days. The medicine can cause nausea, diarrhea, headache or a yeast infection (women only), but it is important that you keep taking the medicine until it is gone.

Children have to take different amounts of the medicine than adults. Health-care workers have information on how to give medicine to children and babies.

## Hoja informativa

# ÁNTRAX: Lo que debe saber

### ¿Qué es el ántrax?

El ántrax es una enfermedad grave causada por una bacteria que forma esporas. Puede enfermarse al entrar en la piel, los pulmones o el sistema digestivo. Puede ser mortal si no se trata.

### ¿Cómo se contrae el ántrax?

Las personas pueden contraer ántrax por tocar o comer un animal infectado o inhalar las esporas de un animal infectado. El ántrax también se puede usar como arma. En 2001, 22 personas se enfermaron cuando se puso ántrax en el correo.

No puede contraer ántrax de otra persona ni contagiarlo a otros.

### ¿Qué sucede si contraigo ántrax?

Las personas normalmente se enferman dentro de 1 a 7 días después de la exposición al ántrax, pero si entra en los pulmones, puede demorar 42 días en enfermarse. Le pueden salir ampollas o llagas en la piel. Puede tener dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza, tos y problemas para respirar.

Necesitará tratamiento con medicamentos porque el ántrax puede causar una enfermedad grave o la muerte.

### ¿Cómo se trata el ántrax?

No hay forma de detectar el ántrax antes de que se enferme.

Se usan antibióticos para tratar todos los tipos de ántrax.

Los trabajadores del área de la salud le darán medicamentos (doxiciclina o ciprofloxacina). Este medicamento puede ayudarle a evitar una infección por ántrax, incluso si no se siente enfermo.

Es posible que deba tomar este medicamento durante 60 días. Este medicamento puede provocar náuseas, diarrea, dolor de cabeza o infección vaginal por levadura (sólo en las mujeres), pero es importante que lo siga tomando hasta que se acabe.

Los niños tienen que tomar diferentes cantidades del medicamento que los adultos. Los trabajadores del área de la salud tienen información sobre cómo darles medicamentos a los niños y bebés.