


## Crushing Ciprofloxacin Pills for Your Child

- For child who weighs less than 73 pounds, you should crush the pill and mix it with a liquid. This will make it easier to give your child the correct amount.
- The amount of medicine depends on the child's weight. Give the amount marked below for your child.
- Give two doses each day. Give one in the morning and one in the evening.
- To make it taste better, the liquid medicine can be mixed with a **small amount** of food or juice. **Be sure the child takes all this mixture to get the full dose of medicine.**

### You will need:

- 1 Ciprofloxacin 500mg pill
- Metal spoon to crush the pill
- Measuring teaspoon
- Small bowl or cup
- 2 teaspoons of water



### Follow these steps:

1. Put the Ciprofloxacin pill into a small bowl or cup.
2. Use the measuring teaspoon to **add 2 teaspoons** of water to the bowl. Let the pill sit in the liquid to soften.
3. **Crush the pill** with the back of the metal spoon until no large pieces are seen.
4. Stir the pill in the liquid for 1 minute to dissolve it.
5. **Measure the amount of liquid medicine** for your child's dose, as marked below. Stir or swirl the liquid to get it mixed well, then quickly use the syringe you were given to measure the dose.

Child's weight	Give this much liquid	How often each day
7-12 pounds (3-5 kg)	1 ml	Two times
13-22 pounds (6-10 kg)	2 ml	Two times
23-33 pounds (11-15 kg)	3 ml	Two times
34-44 pounds (16-20 kg)	4 ml	Two times
45-56 pounds (21-25 kg)	5 ml	Two times
57-72 pounds (26-32 kg)	7.5 ml	Two times
73 pounds or more (33 kg or more)	10 ml	Two times


- The liquid should be kept covered in the refrigerator between doses.
- Mix the pill with liquid each day and throw away unused portions at the end of the day. The medicine mixed with liquid will go bad after 1 day.

## Trituración de pastillas de ciprofloxacina para su hijo

- Para los niños que pesan menos de 33 kilos (73 libras), debe triturar la pastilla y mezclarla con un líquido. Esto facilitará darle la cantidad correcta a su hijo.
- La cantidad del medicamento depende del peso del niño. Dele a su hijo la cantidad que se indica a continuación.
- Administre dos dosis al día, una en la mañana y otra en la noche.
- Para que tenga mejor sabor, el medicamento líquido se puede mezclar con una **pequeña cantidad** de alimento o jugo. **Asegúrese de que su hijo tome toda la mezcla para obtener la dosis completa del medicamento.**

### Necesitará:

- 1 pastilla de ciprofloxacina de 500 mg
- Una cuchara de metal para triturar la pastilla
- Una cuchara de té para medir
- Una taza o un bol pequeño
- 2 cucharas de té de agua



### Siga estos pasos:

1. Coloque la pastilla de ciprofloxacina en una taza o un bol pequeño.
2. Use la cucharadita de medir para **agregar 2 cucharaditas** de agua al recipiente. Deje la pastilla en el líquido para ablandarla.
3. **Triture la pastilla** con la parte trasera de la cuchara de metal hasta que no queden pedazos grandes.
4. Revuelva la pastilla en el líquido durante 1 minuto para disolverla.
5. **Mida la cantidad de medicamento líquido** para la dosis de su hijo, como se indica a continuación. Revuelva el líquido para que se mezcle bien, luego use rápidamente la jeringa que recibió para medir la dosis.

Peso del niño	Administre esta cantidad de líquido	Frecuencia cada día
3 a 5 kg (7 a 12 libras)	1 ml	Dos veces
6 a 10 kg (13 a 22 libras)	2 ml	Dos veces
11 a 15 kg (23 a 33 libras)	3 ml	Dos veces
16 a 20 kg (34 a 44 libras)	4 ml	Dos veces
21 a 25 kg (45 a 56 libras)	5 ml	Dos veces
26 a 32 kg (57 a 72 libras)	7.5 ml	Dos veces
33 kg o más (73 libras o más)	10 ml	Dos veces

- El líquido se debe guardar tapado en el refrigerador entre dosis.
- Mezcle la pastilla con el líquido cada día y deseche las porciones que no se usen al final del día. El medicamento mezclado con el líquido se echará a perder después de 1 día.