


## Crushing Ciprofloxacin Pills for Your Child

- For child who weighs less than 73 pounds, you should crush the pill and mix it with a liquid. This will make it easier to give your child the correct amount.
- The amount of medicine depends on the child's weight. Give the amount marked below for your child.
- Give two doses each day. Give one in the morning and one in the evening.
- To make it taste better, the liquid medicine can be mixed with a **small amount** of food or juice. **Be sure the child takes all this mixture to get the full dose of medicine.**

### You will need:

- 1 Ciprofloxacin 500mg pill
- Metal spoon to crush the pill
- Measuring teaspoon
- Small bowl or cup
- 2 teaspoons of water



### Follow these steps:

1. Put the Ciprofloxacin pill into a small bowl or cup.
2. Use the measuring teaspoon to **add 2 teaspoons** of water to the bowl. Let the pill sit in the liquid to soften.
3. **Crush the pill** with the back of the metal spoon until no large pieces are seen.
4. Stir the pill in the liquid for 1 minute to dissolve it.
5. **Measure the amount of liquid medicine** for your child's dose, as marked below. Stir or swirl the liquid to get it mixed well, then quickly use the syringe you were given to measure the dose.

Child's weight	Give this much liquid	How often each day
7-12 pounds (3-5 kg)	1 ml	Two times
13-22 pounds (6-10 kg)	2 ml	Two times
23-33 pounds (11-15 kg)	3 ml	Two times
34-44 pounds (16-20 kg)	4 ml	Two times
45-56 pounds (21-25 kg)	5 ml	Two times
57-72 pounds (26-32 kg)	7.5 ml	Two times
73 pounds or more (33 kg or more)	10 ml	Two times


- The liquid should be kept covered in the refrigerator between doses.
- Mix the pill with liquid each day and throw away unused portions at the end of the day. The medicine mixed with liquid will go bad after 1 day.

## Nghiên thuốc Ciprofloxacin cho trẻ

- Đối với trẻ nặng chưa tới 33 kg (73 cân Anh), quý vị nên nghiền thuốc và trộn với chất lỏng. Điều này sẽ cho trẻ dùng liều lượng thuốc chính xác hơn.
- Lượng thuốc sẽ tùy theo cân nặng của trẻ. Cho trẻ dùng liều lượng dưới đây.
- Cho trẻ dùng một ngày hai liều. Sáng một liều và tối một liều.
- Để dễ uống, thì có thể trộn thuốc với **một lượng nhỏ** thức ăn hay nước ép trái cây. **Nhớ cho trẻ dùng hết hỗn hợp này để có đủ liều.**

### Quý vị cần:

- 1 viên Ciprofloxacin 500mg
- Muỗng kim loại để nghiền thuốc
- Muỗng cà phê để đo lường
- Chén hay ly nhỏ
- 2 muỗng cà phê nước



### Làm theo các bước sau:

1. Để viên Ciprofloxacin vào trong chén hay ly nhỏ.
2. Dùng muỗng lường để **thêm 2 muỗng cà phê** nước vào chén. Để thuốc vào trong nước cho mềm.
3. **Nghiên thuốc** bằng mặt sau muỗng cho đến khi không còn những miếng lớn.
4. Khuấy thuốc trong chất lỏng 1 phút để làm tan hết.
5. **Lường lượng thuốc lỏng** để tính liều cho trẻ, như ghi dưới đây. Khuấy hay lắc chất lỏng để trộn đều, sau đó nhanh chóng dùng ống chích đã cho để lường thuốc.

Cân nặng của trẻ	Cho dùng	Số lần mỗi ngày
3-5 kg (7-12 cân Anh)	1 ml	Hai lần
6-10 kg (13-22 cân Anh)	2 ml	Hai lần
11-15 kg (23-33 cân Anh)	3 ml	Hai lần
16-20 kg (34-44 cân Anh)	4 ml	Hai lần
21-25 kg (45-56 cân Anh)	5 ml	Hai lần
26-32 kg (57-72 cân Anh)	7.5 ml	Hai lần
33 kg hay nhiều hơn (73 cân Anh hay nhiều hơn)	10 ml	Hai lần

- Nên bọc chất lỏng rồi bỏ vào tủ lạnh giữa những lần dùng.
- Trộn thuốc với chất lỏng mỗi ngày và bỏ phần không dùng vào cuối ngày. Thuốc trộn với chất lỏng sẽ hư sau 1 ngày.