


Crushing Ciprofloxacin Pills for Your Child

- For child who weighs less than 73 pounds, you should crush the pill and mix it with a liquid. This will make it easier to give your child the correct amount.
- The amount of medicine depends on the child's weight. Give the amount marked below for your child.
- Give two doses each day. Give one in the morning and one in the evening.
- To make it taste better, the liquid medicine can be mixed with a **small amount** of food or juice. **Be sure the child takes all this mixture to get the full dose of medicine.**

You will need:

- 1 Ciprofloxacin 500mg pill
- Metal spoon to crush the pill
- Measuring teaspoon
- Small bowl or cup
- 2 teaspoons of water



Follow these steps:

1. Put the Ciprofloxacin pill into a small bowl or cup.
2. Use the measuring teaspoon to **add 2 teaspoons** of water to the bowl. Let the pill sit in the liquid to soften.
3. **Crush the pill** with the back of the metal spoon until no large pieces are seen.
4. Stir the pill in the liquid for 1 minute to dissolve it.
5. **Measure the amount of liquid medicine** for your child's dose, as marked below. Stir or swirl the liquid to get it mixed well, then quickly use the syringe you were given to measure the dose.

Child's weight	Give this much liquid	How often each day
7-12 pounds (3-5 kg)	1 ml	Two times
13-22 pounds (6-10 kg)	2 ml	Two times
23-33 pounds (11-15 kg)	3 ml	Two times
34-44 pounds (16-20 kg)	4 ml	Two times
45-56 pounds (21-25 kg)	5 ml	Two times
57-72 pounds (26-32 kg)	7.5 ml	Two times
73 pounds or more (33 kg or more)	10 ml	Two times


- The liquid should be kept covered in the refrigerator between doses.
- Mix the pill with liquid each day and throw away unused portions at the end of the day. The medicine mixed with liquid will go bad after 1 day.

Écraser des comprimés de Ciprofloxacine pour votre enfant

- Pour un enfant qui pèse moins de 33 kg (73 livres), il vaut mieux écraser le médicament et le mélanger avec un liquide. Il sera ainsi plus facile de donner la quantité correcte à votre enfant.
- La quantité de médicament dépend du poids de l'enfant. Donnez à votre enfant la quantité indiquée ci-dessous.
- Donnez-lui deux doses par jour. Donnez en une le matin et une le soir.
- Pour que son goût soit meilleur, le médicament liquide peut être mélangé avec **une petite quantité** de nourriture ou de jus. **Assurez-vous que l'enfant prenne ce mélange entier afin qu'il reçoive la dose complète du médicament.**

Il vous faudra :

- 1 comprimé de Ciprofloxacine de 500 mg
- une cuillère en métal pour écraser le comprimé
- une cuillère à café pour les mesures
- un petit bol ou une tasse
- 2 cuillères à café d'eau



Suivez ces étapes :

1. Placez la Ciprofloxacine dans un petit bol ou dans une tasse.
2. Utilisez la cuillère à café de mesure pour **ajouter 2 cuillères à café** d'eau dans le bol. Laissez le médicament dans le liquide pour qu'il ramollisse.
3. **Écrasez le médicament** avec le dos de la cuillère en métal jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gros morceaux.
4. Agitez le médicament dans le liquide pendant 1 minute pour le dissoudre.
5. **Mesurez la quantité de médicament liquide** correspondant à la dose de votre enfant, tel qu'indiqué ci-dessous. Agitez ou touillez le liquide pour bien le mélanger, puis utilisez vite la seringue qui vous a été donnée pour mesurer la dose.

Poids de l'enfant	Donnez cette quantité de liquide	Nombre de fois par jour
3-5 kg (7-12 livres)	1 ml	Deux fois
6-10 kg (13-22 livres)	2 ml	Deux fois
11-15 kg (23-33 livres)	3 ml	Deux fois
16-20 kg (34-44 livres)	4 ml	Deux fois
21-25 kg (45-56 livres)	5 ml	Deux fois
26-32 kg (57-72 livres)	7,5 ml	Deux fois
33 kg ou plus (73 livres ou plus)	10 ml	Deux fois

- Entre chaque dose, le liquide doit être conservé recouvert au réfrigérateur.
- Mélangez le médicament avec du liquide tous les jours et jetez ce qui n'a pas été utilisé à la fin de la journée. Le médicament mélangé au liquide ne sera plus bon au bout d'une journée.