



# Giving Doxycycline Pills to Your Child



- The amount of medicine depends on the child’s weight.
- For a child who weighs less than 55 pounds (25kg), you should use the Doxycycline Suspension for your child, not the pills. Please refer to that page for directions.
- **Give two doses each day. Give one in the morning and one in the evening.** Give the amount marked below for your child.
- To make it taste better, the medicine can be crushed and mixed with a **small amount** of food or juice. **Be sure the child takes all this mixture to get the full dose of medicine.**

Child’s weight	Morning Dose Amount	Evening Dose Amount
Under 55 pounds (under 25 kg)	See the page about Doxycycline Suspension for medicine directions	
55-80 pounds (25-36 kg)	½ pill	½ pill
81-98 pounds (37-44 kg)	1 pill	½ pill
99 pounds or more (45kg or more)	1 pill	1 pill

## 子どもにドキシサイクリン錠剤を投与する

- 薬の量は子どもの体重に応じて異なります。
- 体重が 25kg (55 ポンド) 未満の子どもにドキシサイクリン錠剤を投与する場合、錠剤のままではなく懸濁剤にして服用させてください。投与方法については指示を記載したページを参照してください。
- 朝 1 回、夕方 1 回、日に 2 回服用させてください。以下の表を参照して適量を判断してください。
- 薬は飲みやすいように砕いてから少量の食事やジュースなどと混ぜることもできます。食事やジュースに混ぜた場合、薬を全量服用させるために最後まで飲ませてください。

子どもの体重	朝の服用量	夕方の服用量
25kg 未満 (55 ポンド未満)	薬剤に関する指示については、ドキシサイクリン懸濁剤のページを参照してください。	
25～36kg (55～80 ポンド)	½ 錠	½ 錠
37～44kg (81～98 ポンド)	1 錠	½ 錠
45kg 以上 (99 ポンド以上)	1 錠	1 錠