



Giving Doxycycline Pills to Your Child



- The amount of medicine depends on the child’s weight.
- For a child who weighs less than 55 pounds (25kg), you should use the Doxycycline Suspension for your child, not the pills. Please refer to that page for directions.
- **Give two doses each day. Give one in the morning and one in the evening.** Give the amount marked below for your child.
- To make it taste better, the medicine can be crushed and mixed with a **small amount** of food or juice. **Be sure the child takes all this mixture to get the full dose of medicine.**

Child’s weight	Morning Dose Amount	Evening Dose Amount
Under 55 pounds (under 25 kg)	See the page about Doxycycline Suspension for medicine directions	
55-80 pounds (25-36 kg)	½ pill	½ pill
81-98 pounds (37-44 kg)	1 pill	½ pill
99 pounds or more (45kg or more)	1 pill	1 pill



자녀에게 독시사이클린 정제 먹이기



- 복용량은 자녀의 체중에 따라 다릅니다.
- 체중 25 kg(55 파운드) 미만의 자녀는, 정제 대신 독시사이클린 현탁액을 먹여야 합니다. 그 방법은 해당 페이지를 참조하십시오.
- 하루에 두 번 약을 주십시오. 아침에 한 번 저녁에 한 번 주십시오. 아래 표시한 복용량을 주십시오.
- 맛을 좀 더 좋게 하려면 약을 약간의 음식이나 주스와 섞어도 됩니다. 필요한 복용량을 모두 섭취하려면 섞은 액을 모두 마셔야 합니다.

자녀의 체중	아침 복용량	저녁 복용량
25 kg 미만(55 파운드 미만)	독시사이클린 현탁액 먹이는 방법을 참조하십시오.	
25-36 kg(55-80 파운드)	½ 정제	½ 정제
37-44 kg(81-98 파운드)	1 정제	½ 정제
45 kg 이상(99 파운드 이상)	1 정제	1 정제