



Giving Doxycycline Pills to Your Child



- The amount of medicine depends on the child's weight.
- For a child who weighs less than 55 pounds (25kg), you should use the Doxycycline Suspension for your child, not the pills. Please refer to that page for directions.
- **Give two doses each day. Give one in the morning and one in the evening.** Give the amount marked below for your child.
- To make it taste better, the medicine can be crushed and mixed with a **small amount** of food or juice. **Be sure the child takes all this mixture to get the full dose of medicine.**

Child's weight	Morning Dose Amount	Evening Dose Amount
Under 55 pounds (under 25 kg)	See the page about Doxycycline Suspension for medicine directions	
55-80 pounds (25-36 kg)	½ pill	½ pill
81-98 pounds (37-44 kg)	1 pill	½ pill
99 pounds or more (45kg or more)	1 pill	1 pill



Cho trẻ dùng thuốc viên Doxycycline



- Liều lượng thuốc sẽ tùy theo cân nặng của trẻ.
- Đối với trẻ nặng chưa tới 25 kg (55 cân Anh), quý vị nên dùng dịch huyền phù Doxycycline cho em, không phải thuốc viên. Xin tham khảo trang này để biết các chỉ dẫn.
- **Cho dùng mỗi ngày hai liều. Sáng một liều và tối một liều.** Cho dùng theo liều lượng ghi dưới đây cho trẻ.
- Để dễ uống hơn, có thể nghiền thuốc và trộn với **một lượng nhỏ** thức ăn hay trái cây. **Nhớ cho trẻ dùng hết hỗn hợp này để có đủ thuốc.**

Cân nặng của trẻ	Liều buổi sáng	Liều buổi tối
Dưới 25 kg (dưới 55 cân Anh)	Xem trang về Dịch Huyền Phù Doxycycline để biết thêm chỉ dẫn dùng thuốc	
25-36 kg (55-80 cân Anh)	½ viên	½ viên
37-44 kg (81-98 cân Anh)	1 viên	½ viên
45 kg hay hơn (99 cân Anh hay hơn)	1 viên	1 viên