

# Doxycycline

You are being given this medicine because you may have been exposed to Anthrax. You will need to take this medicine for 60 days. You will be told how to get more medicine if it is needed.

## Dosing Information

- Take the medicine every 12 hours or as directed.
- For 2 hours before and 2 hours after taking this medicine, do not take antacids or milk products or juices with added calcium. Antacids such as Tums, Rolaids or milk of magnesia, and milk products like milk, cheese or yogurt, and calcium can lessen how well the medicine works.
- Take the medicine with a full glass of water and eat some food so the medicine will not irritate your stomach.
- If you miss a dose, take the missed dose right away. If it is almost time to take your next dose, wait until then to take your medicine and skip the missed dose. Do not take two doses at the same time.
- You must keep taking your medicine for the full 60 days. You may become ill if you do not finish all your medicine.

## Side Effects

- This medicine can cause upset stomach, vomiting, or diarrhea, but **you need to keep taking this medicine if any of these occur**. This medicine can make it easier to get a sunburn on your skin. Wear sunscreen.
- **Call your doctor right away** if you have:
  - shortness of breath
  - trouble breathing
  - swelling of the face, lips, tongue or throat

## Interactions

- Birth control medicine may not work as well when you take Doxycycline. Use condoms for birth control when taking Doxycycline.
- If you take warfarin (Coumadin), digoxin, Accutane, lithium, insulin, methotrexate, barbiturates, phenytoin (Dilantin), carbamazepine (Tegretol), or rifampin, **call 211 or call your doctor to tell them that you are taking Doxycycline**. These medicines can cause problems if taken while taking Doxycycline.
- Do not use any herbs, especially St. John's Wort and Dong Quai while taking this medicine.

# ドキシサイクリン

この錠剤は、炭疽菌に曝露された可能性がある方に処方されます。60 日間にわたってこの薬を服用する必要があります。服用する必要がある場合、服用方法について説明されます。

## 服用情報

- 12時間毎、または処方のおりに薬を服用します。
- この薬を服用する前後2時間は制酸薬や牛乳、またはカルシウム添加ジュースを飲まないでください。Tums (胃薬)、Rolaids (胸焼け予防薬)、マグネシウム乳剤、牛乳、チーズ、ヨーグルトなどの乳製品、およびカルシウムにより、薬の効果が抑えられる場合があります。
- 薬によって胃が荒れるのを防ぐために、コップいっぱいの水と食べ物と一緒に薬を服用します。
- 1回服用することを忘れてたら、すぐに忘れて分を服用してください。次の服用のタイミングに時間が近ければそれまで待ってから、忘れて分を服用してください。1度に2回分服用することは避けてください。
- 60日間にわたってこの薬を服用する必要があります。薬を服用しきらないと発症する恐れがあります。

## 副作用

- この薬は胃のむかつき、嘔吐や下痢などを引き起こす場合がありますが、それでも服用を続ける必要があります。この薬を服用すると、皮膚が日焼けしやすくなるので日焼け止めを使用してください。
- 以下の症状が現れた場合は直ちに主治医に連絡してください。
  - 息切れ
  - 呼吸困難
  - 顔、唇、舌、または喉の腫れ

## 相互作用

- ドキシサイクリンを服用中は避妊薬の効果が制限される場合がありますので、避妊にはコンドームを使用してください。
- ワーファイン (Coumadin)、ジゴキシン、アキュテイン、リチウム、インシュリン、メトトレキサート、バルビツール酸系催眠薬、フェニトイン (Dilantin)、カルバマゼピン (Tegretol)、またはリファンピンを服用する場合、211番または主治医に連絡してシプロフロキサシンを服用していることを教えてください。これらの薬はドキシサイクリンと併用すると副作用が現れる場合があります。
- この薬は特にセント・ジョーンズ・ワート (セイヨウオトギリソウ) およびドンカイなどの漢方と併用しないでください。