

Hearing Loss

Hearing loss is a sudden or gradual decrease in being able to hear. There are different types of hearing loss:

- **Conductive Hearing Loss:** Sound is blocked. This is often caused by earwax build up.
- **Sensorineural Hearing Loss:** A nerve problem prevents proper hearing. This is often caused by aging.
- **Mixed Hearing Loss:** Hearing loss where both the conductive and sensorineural systems are affected.

Causes

- Aging
- Loud noise exposure
- Blockage
- Ear infection
- Certain medicines
- Ear and head injury
- Some illnesses
- Born with an ear problem
- Family members with hearing loss

Signs

- Sounds are muffled.
- High pitched sounds are hard to hear.
- Words are difficult to understand when there is background noise.
- You ask others to repeat, or speak more slowly, clearly or loudly.

Втрата слуху

Втрата слуху - це раптове або поступове зниження здатності чути. Існують різні типи втрати слуху:

- **Кондуктивна втрата слуху:** Звук блокується. Вона найчастіше спричиняється нагромадженням вушної сірки.
- **Нейросенсорна втрата слуху:** Проблема з нервами не дозволяє нормально чути. Це найчастіше спричиняється старінням.
- **Змішана втрата слуху:** Втрата слуху, спричинена ушкодженнями звукопровідних і нейросенсорних систем.

Причини

- Старіння
- Вплив сильного шуму
- Закупорка
- Вушна інфекція
- Деякі ліки
- Травми вух і голови
- Деякі захворювання
- Вроджені проблеми з вухами
- Члени родини з втратою слуху

Ознаки

- Звуки здаються приглушеними.
- Труднощі з чутністю звуків високої тональності.
- При наявності фонового шуму важко розуміти слова.
- Ви просите інших повторити або говорити повільніше, чіткіше або голосніше.

Hearing Loss. Ukrainian.

- You speak more loudly than other people.
- You avoid conversations or social events.
- You turn up the volume on the TV or radio.
- You have dizziness, and ringing or buzzing in your ears.

Your Care

Tests will be done to find the cause of your hearing loss and measure how well you can hear. Your doctor will check your outer, middle and inner ear.

Depending on the cause of your hearing loss, your treatment may include:

- Removal of ear wax
- Medicines
- Hearing aides
- Listening devices such as headphones or flashing lights or vibrators for doorbells or phones
- Surgery
- Therapy to help with your speech and hearing

Preventing Hearing Loss

- Protect your ears from loud noises. Wear earplugs when working with machines or around loud noises.

- Ви говорите голосніше, ніж інші люди.
- Ви уникаєте бесід або зустрічей з друзями.
- Ви робите голосніше звучання телевізора або радіоприймача.
- У Вас запаморочення і дзвін або дзижчання у вухах.

Медичний догляд

Для того, щоб визначити причину втрати слуху і виміру того, наскільки добре Ви можете чути, буде потрібно проведення обстежень. Ваш лікар перевірить Ваше зовнішнє, середнє і внутрішнє вухо.

В залежності від причини втрати слуху Ваше лікування може полягати в наступному:

- Видалення вушної пробки
- Ліки
- Застосування слухового апарату
- Застосування пристроїв для прослуховування, таких як навушники або миготливі вогні або вібратори для дверних дзвоників або телефонів
- Хірургічна операція
- Терапія, що допомагає Вашому мовленню і слухові

Запобігання втрати слуху

- Захищайте свої вуха від голосних звуків. При роботі з механізмами або неподалік від голосного шуму, використовуйте противошумові вкладиші.

- Avoid loud noises such as music, motorcycles or snowmobiles.
- Have your hearing tested.

Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.

2005 – 2/2011 Health Information Translations

Unless otherwise stated, user may print or download information from www.healthinfotranslations.org for personal, non-commercial use only. The medical information found on this website should not be used in place of a consultation with your doctor or other health care provider. You should always seek the advice of your doctor or other qualified health care provider before you start or stop any treatment or with any questions you may have about a medical condition. The Ohio State University Medical Center, Mount Carmel Health System, OhioHealth and Nationwide Children's Hospital are not responsible for injuries or damages you may incur as a result of your stopping medical treatment or your failure to obtain medical treatment.

- Уникайте голосних звуків, наприклад музики, шуму мотоциклів або снігоходів.
- Здійснюйте перевірку слуху.

**Якщо у Вас виникають питання або сумніви, зверніться до
Вашого лікаря або медичної сестри.**

2005 – 2/2011 Health Information Translations

Unless otherwise stated, user may print or download information from www.healthinfotranslations.org for personal, non-commercial use only. The medical information found on this website should not be used in place of a consultation with your doctor or other health care provider. You should always seek the advice of your doctor or other qualified health care provider before you start or stop any treatment or with any questions you may have about a medical condition. The Ohio State University Medical Center, Mount Carmel Health System, OhioHealth and Nationwide Children's Hospital are not responsible for injuries or damages you may incur as a result of your stopping medical treatment or your failure to obtain medical treatment.

Hearing Loss. Ukrainian.