



Male Circumcision

Male circumcision is the removal of the foreskin around the end of the penis. If you decide on circumcision, your baby's doctor will do it in the hospital's nursery. If your baby is small or has any medical problems, the circumcision may need to be done later. The doctor will have you sign a consent form before the procedure is done.

uncircumcised penis



circumcised penis



During the Procedure

- The doctor will put a numbing medicine gel on the penis.
- Your baby may be offered a pacifier dipped in sugar water to ease pain.
- Your baby's legs will be held still while the foreskin is removed.
- The procedure lasts 5 to 10 minutes.

After the Procedure

The penis is wrapped with Vaseline-soaked gauze. The gauze will fall off on its own and may be left off. The stitches under the gauze will dissolve and do not need to be removed. This is called the clamp method.


or

The penis has a plastic ring around it. The ring will fall off in 5 to 7 days. There are no stitches to be removed.


पुरुषों का खतना

पुरुषों का खतना शिश्न के सिरे के पास की चमड़ी को हटाने को कहते हैं। यदि आप खतना कराने का निर्णय करते हैं, तो आपके बच्चे का डॉक्टर अस्पताल की नर्सरी में ऐसा कर देगा। अगर आपका बच्चा छोटा है या उसे कोई अन्य चिकित्सकीय समस्या है, तो खतना बाद में करना पड़ सकता है। प्रक्रिया पूरी करने से पहले डॉक्टर आपसे सहमति पत्र पर दस्तखत कराएगा।

खतनारहित लिंग



खतना किया हुआ लिंग



प्रक्रिया के दौरान

- डॉक्टर शिश्न पर सुन्न करने वाली दवा का जेल लगाएगा।
- आपके बच्चे को दर्द कम करने के लिए मीठे पानी में भिगोया हुआ पेसीफायर दिया जा सकता है।
- चमड़ी हटाने के समय आपके बच्चे के पैरों को पकड़कर स्थिर रखा जाएगा।
- प्रक्रिया 5 से 10 मिनट चलेगी।

प्रक्रिया के बाद

- शिश्न को वैसलीन में भीगे गॉज में लपेटा जाता है। गॉज अपने आप गिर जाएगी और उसे छोड़ा जा सकता है। गॉज के नीचे के टांके घुल जाएंगे और उन्हें हटाने की आवश्यकता नहीं है। इसे क्लैम्प विधि कहा जाता है।

या

- शिश्न के चारों ओर एक प्लास्टिक का छल्ला होता है। छल्ला 5 से 7 दिनों के भीतर गिर जाएगा। हटाने के लिए टांके नहीं होंगे।

- There may be swelling that will go away in about 4 days.
- Your baby may be fussy, not eat well or sleep more for the first 24 hours.
- As the penis heals, yellowish-white patches may appear. Do not try to wipe these off. The patches will go away as it heals.
- Children's acetaminophen (Tylenol) may be given as ordered by your baby's doctor for pain.

Home Care

- Change diapers often. With each diaper change:
 - ▶ Rinse the area with warm water only, no soap, until the penis heals. Pat dry.
 - ▶ Avoid using diaper wipes. These contain alcohol which will be painful to the unhealed penis.
 - ▶ Look for signs of infection such as redness, swelling or a foul odor.
 - ▶ Apply a small amount of Vaseline or antibiotic ointment around the tip of the penis. Do this until healing is complete.
 - ▶ With the clamp method, it is important to be able to see the entire glans with each diaper change. After 1 to 2 days, if you do not see the glans, gently push the skin back until the entire glans is exposed.
- Your baby can take a tub bath after the penis is healed and the umbilical cord has fallen off.

- वहाँ सूजन हो सकती है जो लगभग 4 दिनों के भीतर चली जाएगी।
- आपका बच्चा पहले 24 घंटे तक चिड़चिड़ा रहे, ठीक से नहीं खाए या ज्यादा सोए ऐसा हो सकता है।
- शिश्न के घाव भरते हुए, पीले-सफेद धब्बे दिख सकते हैं। इन्हें पोंछने की कोशिश न करें। इसके घाव भरते ही धब्बे खत्म हो जाएंगे।
- दर्द के लिए आपके बच्चे के चिकित्सक के आदेश द्वारा बच्चों का एसिटामिनोफेन (टाइलिनॉल) दिया जा सकता है।

घर पर देखभाल

- अकसर डायपर बदलें। प्रत्येक डायपर बदलने के साथरू
 - ▶ स्थान को केवल गुनगुने पानी से ही साफ करें, किसी साबुन का इस्तेमाल ना करें जब तक कि शिश्न ठीक नहीं हो जाता। थपकी देकर सुखाएं।
 - ▶ डायपर वाइप्स के उपयोग से बचें। इनमें एल्कोहल होता है जो ठीक ना हुए शिश्न को दर्द पहुँचा सकता है।
 - ▶ लाली, सूजन या बदबू जैसे संक्रमण के लक्षणों को देखें।
 - ▶ शिश्न के सिरे पर थोड़ी –सी वैसलीन या एंटीबायोटिक मलहम लगाएँ। घाव के भर जाने तक ऐसा करें।
 - ▶ क्लैम्प विधि के साथ, हर बार डायपर बदलने पर पूरे ग्लैन्स को देख पाना आवश्यक है। 1 से 2 दिनों के बाद यदि आपको ग्लैन्स दिखाई नहीं देते हैं, तो चमड़ी को धीरे से पीछे की ओर धकेलें जब तक कि पूरा ग्लैन्स दिखाई ना दे।
- शिश्न का घाव भर जाने और नाल गिर जाने के बाद आपका बच्चा टब में नहा सकता है।

Call your baby's doctor if you notice:

- More than a few drops of blood on the penis or diaper
- No urine output within 12 hours of the circumcision or very few wet diapers several days after
- Increased redness or swelling, or a foul odor
- Redness moving down the penis toward the abdomen. This may be a sign of infection.
- Pus-like drainage from the penis
- You have trouble exposing the glans
- The plastic ring stays on for more than 10 days

Talk to your baby's doctor if you have any questions or concerns.

अपने बच्चे के डॉक्टर को फोन करें अगर:

- काफी खून बहे या डायपर पर खून के बड़े धब्बे हों
- खतने के 12 घंटे के भीतर मूत्र ना आना या बहुत दिनों के बाद बहुत कम डायपर गीले होना
- लाली या सूजन बढ़ जाए या बदबू आने पर
- शिशु को पेट की तरफ बढ़ाने पर लाली होना, यह संक्रमण का लक्षण हो सकता है
- शिशु से मवाद जैसा पदार्थ निकलना
- ग्लैन्स को खोलने में परेशानी होना
- प्लास्टिक के छल्ले का 10 दिनों से भी अधिक तक रहना

अगर आपके कोई सवाल या चिंताएं हो तो अपने बच्चे के डॉक्टर से बात करें ।