

Nitroglycerin

Nitroglycerin is a medicine used to treat chest pain called angina. **Take nitroglycerin as directed by your doctor.**

- If you are pregnant or breastfeeding, talk to your doctor before using this medicine.
- Always keep your nitroglycerin with you.
- This medicine may make you dizzy or lightheaded when you stand up or get out of bed. Get up slowly from a sitting or lying position.
- Ask your doctor if it is safe for you to drink alcohol while using nitroglycerin medicine.
- Keep nitroglycerin in its original bottle to keep its strength. The medicine should cause a sting or a tingle under your tongue. If not, you may need a new bottle of medicine.
- Keep the medicine out of the reach of children.

If you use tablets:

1. Sit down and rest 2 to 3 minutes.
2. If you have chest pain or discomfort that is not better with rest, place 1 tablet under your tongue. Do not swallow the tablet.
3. If you still have chest pain after 5 minutes, put a second tablet under your tongue.
4. If the chest pain does not go away after another 5 minutes, use a third tablet. You may take up to 3 tablets in 15 minutes.
5. If you still have pain, **call 911**. Do not drive yourself to the hospital because you may be having a heart attack.

Nitroglycérine

La nitroglycérine est un médicament utilisé pour traiter les douleurs thoraciques appelées angine de poitrine. **Prenez de la nitroglycérine selon les indications de votre médecin.**

- Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, parlez à votre médecin avant d'utiliser ce médicament.
- Gardez toujours votre nitroglycérine avec vous.
- Ce médicament peut entraîner des étourdissements ou des vertiges lorsque vous vous levez ou que vous sortez du lit. Levez-vous doucement lorsque êtes en position assise ou allongée.
- Demandez à votre médecin s'il est prudent de boire de l'alcool tout en prenant de la nitroglycérine.
- Gardez la nitroglycérine dans son flacon d'origine pour qu'elle conserve toutes ses propriétés. Le médicament doit provoquer une sensation de piquûre ou de fourmillements sous votre langue. Sinon, il vous faut peut-être un nouveau flacon de nitroglycérine.
- Conservez le médicament hors de la portée des enfants.

Si vous utilisez des comprimés :

1. Asseyez-vous et reposez-vous pendant 2 à 3 minutes.
2. Si vous ressentez une douleur thoracique ou une gêne qui ne disparaît pas avec le repos, prenez 1 comprimé sous la langue. N'avalez pas le comprimé.
3. Si vous ressentez toujours des douleurs thoraciques au bout de 5 minutes, prenez un deuxième comprimé sous la langue.
4. Si les douleurs thoraciques ne disparaissent pas au bout de 5 minutes de plus, prenez un troisième comprimé. Vous pouvez prendre jusqu'à 3 comprimés en 15 minutes.
5. Si vous avez toujours mal, **faites le 911**. Ne prenez pas votre voiture pour vous rendre à l'hôpital car vous pouvez avoir une crise cardiaque.

If you use spray:

1. Sit down and rest for 2 to 3 minutes.
2. If you have chest pain or discomfort that is not better with rest, hold the can up with the spray button on top as close to your mouth as you can
3. Press down on the button and spray the medicine onto your tongue or under it. Don't swallow right away. Wait 10 seconds.
4. If your chest pain lasts longer than 5 minutes, spray a second dose into your mouth.
5. If the chest pain does not go away after another 5 minutes, spray a third dose. You may use up to 3 sprays in 15 minutes.
6. If you still have pain, **call 911**. Do not drive yourself to the hospital because you may be having a heart attack.

Call your doctor if you have any of these medicine side effects:

- Flushed or hot face
- Nausea or vomiting

Call your doctor or 911 right away if you have any of these side effects:

- Trouble breathing
- Increased chest pain
- Dizziness, fainting or severe weakness
- Severe headaches
- Itching or swelling
- Blurred vision
- Dry mouth

Si vous utilisez un pulvérisateur :

1. Asseyez-vous et reposez-vous pendant 2 à 3 minutes.
2. Si vous ressentez des douleurs thoraciques ou une gêne qui ne s'améliore pas avec le repos, maintenez le pulvérisateur droit, le bouton vers le haut, le plus près possible de votre bouche.
3. Appuyez sur le bouton et pulvérisez le médicament sur votre langue ou sous votre langue. N'avalez pas immédiatement. Attendez pendant 10 secondes.
4. Si vos douleurs thoraciques durent plus de 5 minutes, pulvérisez une seconde dose dans votre bouche.
5. Si les douleurs thoraciques ne disparaissent toujours pas au bout de 5 minutes de plus, pulvérisez une troisième dose. Vous pouvez pulvériser jusqu'à 3 doses en 15 minutes.
6. Si vous avez toujours mal, **faites le 911**. Ne prenez pas votre voiture pour vous rendre à l'hôpital car vous pouvez avoir une crise cardiaque.

Appelez votre médecin si vous avez un de ces effets secondaires du médicament :

- Rougeurs ou sensation de chaleur au niveau du visage
- Nausée ou vomissements

Appelez immédiatement votre médecin ou le 911 si vous avez un de ces effets indésirables :

- Difficultés à respirer
- Douleurs thoraciques accrues
- Évanouissements, étourdissements ou sensation de faiblesse intense
- Maux de tête forts
- Démangeaisons ou gonflements
- Vision trouble
- Bouche sèche

Talk to your doctor, nurse or pharmacist if you have any questions or concerns about taking nitroglycerin.

2005 – 9/2010 Health Information Translations

Unless otherwise stated, user may print or download information from www.healthinfotranslations.org for personal, non-commercial use only. The medical information found on this website should not be used in place of a consultation with your doctor or other health care provider. You should always seek the advice of your doctor or other qualified health care provider before you start or stop any treatment or with any questions you may have about a medical condition. The Ohio State University Medical Center, Mount Carmel Health System, OhioHealth and Nationwide Children's Hospital are not responsible for injuries or damages you may incur as a result of your stopping medical treatment or your failure to obtain medical treatment.

Parlez à votre médecin, infirmière ou pharmacien si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant la prise de nitroglycérine.

2005 – 9/2010 Health Information Translations

Unless otherwise stated, user may print or download information from www.healthinfotranslations.org for personal, non-commercial use only. The medical information found on this website should not be used in place of a consultation with your doctor or other health care provider. You should always seek the advice of your doctor or other qualified health care provider before you start or stop any treatment or with any questions you may have about a medical condition. The Ohio State University Medical Center, Mount Carmel Health System, OhioHealth and Nationwide Children's Hospital are not responsible for injuries or damages you may incur as a result of your stopping medical treatment or your failure to obtain medical treatment.

Nitroglycerin. Africa French