

When Should I Call My Baby's Doctor?

Call 911 if your baby turns blue or has trouble breathing.

Call your baby's doctor if your baby has any of the following:

- Cries non-stop for several hours or is more irritable and soothing does not stop crying
- A temperature above 100.4 degrees Fahrenheit checked under the arm for babies older than 2 months, or rectally for babies less than 2 months of age.
- Frequent discharge from the eyes
- A hard time breathing
- Yellowing or rash on the skin that gets worse
- Redness, discharge or a foul smell from a healing umbilical cord or circumcision area
- Breastfeeding less often or taking less formula for more than 8 hours
- Green vomit or vomiting after more than 2 feedings in a row
- Hard to wake up
- Fewer than 6 to 8 wet diapers in 24 hours
- Change in stool patterns, constipation or diarrhea
- Cough that will not go away, especially if there is a rash
- Poor muscle control or baby feels floppy when held
- Convulsions or seizures

担当医師に連絡するとき

赤ちゃんの顔色が青くなったり呼吸困難が認められた場合は、**911**に電話してください。

赤ちゃんに以下のような症状が出た場合は、かかりつけの医師に連絡してください。

- 何時間も泣き続けたり、泣き方がどんどん激しくなったりして、あやしても泣き止まない
- 月齢 2 ヶ月以上の赤ちゃんは脇の下で体温を測り、2 ヶ月未満の赤ちゃんはおしりで測って、38 °C (100.4 °F) を超えている
- 目やにが頻繁に出る
- 呼吸がしづらそう
- 皮膚に黄変や発疹が認められ悪化している
- へそまたは包皮切開部分が赤くなっている、分泌物が出ている、悪臭がする
- 母乳の授乳間隔が長くなり、あるいは飲む粉ミルクの量が少なくなって 8 時間以上経つ
- 緑色の吐瀉物を吐いたり、3 回以上続けて授乳後に吐いたりする
- 目を覚まさない
- 24 時間以内におむつが濡れる回数が 6~8 回より少ない
- 便のパターンの変化、便秘、下痢
- 咳がとまらない (特に発疹がある場合)
- 筋肉のコントロールが弱い、または赤ちゃんを抱いたときにぐにゃぐにゃした感じがする
- けいれんや発作

If you have any concerns about your baby's health, call your baby's doctor, family doctor or health clinic. Never be shy about calling the doctor's office. Often talking to your baby's doctor or nurse will help you decide if your baby needs medical care. When you call the doctor, have written down:

- What is wrong with your baby and when the signs started
- Your baby's temperature
- Any allergies your baby has to food, medicine or environment
- The name and phone number of your pharmacy

Keep a paper and pen nearby to write down the doctor's instructions.

赤ちゃんの健康に不安があるときは、赤ちゃんの担当医、家庭医、または診療所にご連絡ください。医師への連絡をためらわないでください。医師や看護師に相談することは、赤ちゃんが医療機関による治療を必要としているかどうかを判断する助けとなります。医師に連絡する際には、以下のことをあらかじめメモしておきましょう。

- 赤ちゃんの症状とそれがいつ始まったか
- 赤ちゃんの体温
- 食べ物、薬、環境に対する赤ちゃんのアレルギー
- かかりつけの薬局の名前と電話番号

紙とペンを用意しておき医師の指示を書き留めます。

2007 – 1/2012 Health Information Translations

Unless otherwise stated, user may print or download information from www.healthinfotranslations.org for personal, non-commercial use only. The medical information found on this website should not be used in place of a consultation with your doctor or other health care provider. You should always seek the advice of your doctor or other qualified health care provider before you start or stop any treatment or with any questions you may have about a medical condition. Wexner Medical Center at The Ohio State University, Mount Carmel Health System, OhioHealth and Nationwide Children's Hospital are not responsible for injuries or damages you may incur as a result of your stopping medical treatment or your failure to obtain medical treatment.

When Should I Call My Baby's Doctor?. Japanese.