

언제 아기의 의사에게 전화를 해야 하나요?

When Should I Call My Baby's Doctor?

Call 911 if your baby turns blue or has trouble breathing.

아기가 퍼렇게 되거나 호흡에 문제가 있는 경우 **911**에 연락하십시오.

Call your baby's doctor if your baby has any of the following:

다음의 경우 아기 의사에게 연락하십시오.

- Cries non-stop for several hours or is more irritable and soothing does not stop crying
- Hard to wake up
- Fever:
 - A rectal temperature (in baby's bottom) of 100.4° F or higher, or an armpit (axillary) temperature of 99° F or higher
 - Fever does not come down with medicine
 - Fever lasts more than 24 hours
- A lot of discharge from the eyes
- A hard time breathing or skin below or between baby's ribs pulls in when breathing.
- Yellowing or rash on the skin that gets worse
- Redness, discharge or a foul smell from a healing umbilical cord or circumcision
- Breastfeeding less often or taking less formula for more than 8 hours
- Green vomit or vomiting after more than 2 feedings in a row
- Fewer than 6 to 8 wet diapers in 24 hours
- Constipation or diarrhea
- Cough that will not go away, especially if there is a rash

- 몇 시간 동안 계속 울거나 더 짜증을 부리고 달래도 울음을 그치지 않을 때
- 깨우기 힘들 때
- 발열:
 - 직장 온도(아기의 하단)가 화씨 100.4° 이상 또는 겨드랑이 온도가 화씨 99° 이상
 - 약으로 열이 내려가지 않을 때
 - 열이 24시간 이상 지속될 때
- 눈의 분비물이 너무 많을 때
- 호흡이 힘들거나 호흡할 때 아기의 갈비뼈 아래나 사이의 피부가 당겨질 때.
- 피부가 노래지거나 발진이 더 심해질 때
- 텃줄이나 포경수술이 나오면서 빨개지거나 분비물이 배출되거나 이상한 냄새가 날 때
- 모유 수유가 줄거나 8시간 이상 동안 분유를 먹는 양이 줄 때
- 초록색 구토물 또는 두 번의 수유 후 연속으로 구토할 때
- 24시간 동안 기저귀를 적시는 횟수가 6~8 회 이하일 때
- 변비 또는 설사
- 기침이 멈추지 않을 때, 특히 발진이 있을 때

- Cough that will not go away, especially if there is a rash
- Poor muscle control or baby feels floppy when held
- Convulsions or seizures (body gets stiff, eyes rolls, legs thrash around)
- Baby seems to have an earache (stiff neck or pulls at ears).

If you have any concerns about your baby's health, call your baby's doctor, family doctor or health clinic. Be sure to tell them the baby's name and age.

Never be shy about calling the doctor's office. Often talking to your baby's doctor or nurse will help you decide if your baby needs medical care. When you call the doctor, have written down:

- What is wrong with your baby and when the signs started
- Your baby's rectal temperature
- Any allergies your baby has to food, medicine or environment
- Name and phone number of your pharmacy
- Type of medicine you have given and how much

Keep a paper and pen nearby to write down the doctor's instructions.

- 기침이 멈추지 않을 때, 특히 발진이 있을 때
- 근육 조절을 잘 못하거나, 잡았을 때 아기가 흐느적거릴 때
- 경련이나 발작(몸이 뻣뻣해지고, 눈이 돌아가고, 다리로 몸부림을 칩)
- 아기가 귀앓이를 하는 것처럼 보일 때.

만약 아기의 건강에 대한 걱정이 있는 경우 아기의 의사, 주치의 또는 클리닉에 전화하십시오. 아기의 이름과 연령을 말해야 합니다.

의사 진료소에 전화하는 것을 창피해하지 마십시오. 아기의 의사 또는 간호사와 연락하는 것은 아기가 의료 진단이 필요한지를 결정하는 데 도움이 될 것입니다. 의사에게 전화하기 전, 다음 사항을 적으십시오.

- 아픈 곳과 증상이 나타난 시점
- 아기의 직장 온도
- 음식, 약 또는 환경에 대한 알러지 반응
- 약국 이름과 전화 번호
- 먹인 약의 종류와 양

의사의 지시를 적을 수 있는 종이와 볼펜을 가까운 곳에 두십시오.